

产广东、海南、广西和云南、西藏（墨脱、察隅、芒康）。常见于低海拔林中湿地上。分布于中南半岛和印度东北部和安达曼、锡金、不丹、斯里兰卡、孟加拉国、马来西亚、加里曼丹等地。

1b. 长叶弯管花（变种）（海南植物志）

var. **longifolia** Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 177. 1880; 海南植物志 **3**: 354. 1974.

本变种与原变种的区别是叶较狭长，侧脉常不很明显。花期夏季。

产地和分布同原变种，但较少见。

72. 爱地草属 *Geophila* D. Don, nom. cons.

D. Don, Prodr. Fl. Nep. 136. 1825 (non *Geophila* Bergeret 1803);
Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. **2**: 127. 1873; K.
Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **IV** (4): 118.
1891; Li in Journ. Arn. Arb. **25**: 429. 1944; F. N. Haper in
Taxon **9**: 88—89. 1961.

多年生草本。叶对生，具长柄；托叶生叶柄间，通常卵形，全缘。花通常小，单生或数朵排成顶生和腋生的伞形花序，无梗或近无梗，着生于总花梗的顶端；苞片小，通常线形；萼管倒卵形，萼檐短，4裂或5—7裂，裂片宿存；花冠管状漏斗形，喉部被毛，檐部4裂或5—7裂，裂片镊合状排列；雄蕊与花冠裂片同数而互生，花丝丝状，花药背着，内藏或略伸出；花盘肥厚；子房2室，每室有1颗基生、直立的胚珠，花柱线形，柱头2裂。核果肉质，含2枚分核，分核平凸；种子腹面平坦，种皮膜质，胚乳角质，胚根短，向下。

属模式：爱地草 *G. herbacea* (Jacq.) K. Schum. (= *G. reniformis* D. Don, nom. illeg.)

约30余种，主产亚洲热带和非洲，少数产美洲，我国仅1种。

1. 爱地草（海南植物志） 图版15: 5—9

Geophila herbacea (Jacq.) K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **IV** (4): 118. 1891. — *Psychotria herbacea* Jacq. Enum. Pl. Carib. 16. 1760; Linn. Sp. Pl. ed 2, 245. 1762. — *Geophila reniformis* D. Don, Prodr. Fl. Nep. 136. 1825. — *Geophila herbacea* (Linn.) O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. **1**: 1300. 1891; 海南植物志 **3**: 359, 图771. 1974; 中国高等植物图鉴 **4**: 272, 图5957. 1975; 台湾植物志 **4**: 267, 图995. 1978.

多年生、纤弱、匍匐草本，长可达40厘米或过之；茎下部的节上常生不定根。叶