

产云南西双版纳。生于海拔 700—900 米处的林下。分布于泰国南部。

2. 长梗粗叶木 (华南植物学报) 图版 19: 1—7

Lasianthus filipes Chun ex Lo in Bot. Journ. South China 2: 8, fig. 2. 1993.


灌木, 高 1—3 米; 小枝较纤细, 密被贴伏的柔毛。叶具等叶性, 叶片纸质, 卵形或卵状长圆形, 长通常 5—8 厘米, 很少达 10 厘米, 宽 2—3 厘米, 很少达 4 厘米, 顶端骤然渐尖, 基部钝或圆, 有时近截平或微心形, 边缘常被毛, 干时常绿灰色, 上面无毛, 略有光泽, 下面脉上被贴伏柔毛或短硬毛; 中脉在上面常稍压入, 侧脉每边约 4—5 条, 有时 6 条, 下面凸起, 小脉纤细, 横行, 分枝联结成不明显的长方形网眼; 叶柄短, 长 1—5 毫米, 密被硬毛。花序多花, 腋生, 密被硬毛, 具纤细、1—5 厘米长的总梗, 总梗不分枝或有 2 个短小分枝; 苞片小, 钻状丝形, 长 1—2.5 毫米; 花具短梗; 萼管近陀螺状, 长 1.5 毫米, 裂片 5, 钻形, 长约 1.5 毫米, 均被硬毛; 花冠白色, 近管状, 长约 5—6 毫米, 芽时顶部被柔毛, 冠管下部略膨大, 外面被粉状短毛, 里面中部以上密被白色长柔毛, 裂片 5, 三角状卵形, 长约 1.5 毫米, 顶端内弯呈长喙状, 里面密被白色长柔毛; 雄蕊 5, 生冠管喉部, 花丝极短, 花药长约 1.2 毫米, 微露出; 花柱长 4.5 毫米, 柱头长 0.8 毫米, 微伸出。核果近球形, 径约 7—8 毫米, 成熟时蓝色, 近无毛; 分核 5 个, 长约 3 毫米。

产福建 (龙岩)、广东 (信宜、茂名)、广西 (大苗山、大瑶山、防城、那坡)、云南 (屏边、河口、西畴)。生于山地林中或灌丛。模式标本采于广东信宜。

3. 黄毛粗叶木 (海南植物志) 蛇咬草 (广西宁明) 图版 23: 7—11

Lasianthus koi Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 47. 1934; 海南植物志 3: 334. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 245, 图 5903. 1975; Lo in Bot. Journ. South China 2: 14. 1993. ——*L. rhinocerotis* Bl. var. *pedunculatus* Pitard in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 395. 1924 (non *L. pedunculatus* E. A. Bruce); H. Zhu in Acta Phytotax. Sinica 32 (1): 73. 1994.

灌木, 高 1.5—3 米; 小枝粗壮, 圆柱状, 和托叶、叶下面及花序均密被褐色、微有光泽的长柔毛或绒毛。叶薄革质, 披针形或长圆状披针形, 长 10—21 厘米, 通常 15 厘米以上, 宽 4—7 厘米, 顶端尾状渐尖或渐尖, 基部圆或钝, 常有缘毛, 上面无毛, 干时通常微有光泽; 中脉在上面压入, 下面凸起, 侧脉每边 8—10 条, 很少 7 条, 和横行的小脉均在下面凸起, 上面不明显; 叶柄粗壮, 长 5—10 毫米或稍过之, 密被毛; 托叶小, 隐于毛被中。花序极多花, 生于腋生、粗壮、长 0.5—1.2 厘米的总梗上, 或总梗有时缩至很短; 苞片和小苞片很多, 直或弯卷, 通常线形, 长 6—12 毫米, 有时达 20 毫米, 宽 1—2 毫米, 渐尖, 密被褐黄色长柔毛; 花无梗; 萼管长约 4 毫米, 被疏柔毛, 萼檐 6 裂, 裂片狭披针形, 长约 3 毫米, 密被长柔毛; 花冠白色或微染紫色, 冠管长约 4 毫米, 下部两面近无毛, 靠近口部被长柔毛, 裂片常 5 片, 长圆形, 长约 3 毫



图版 19 1—7. 长梗粗叶木 *Lasianthus filipes* Chun ex Lo: 1. 花枝; 2. 花序; 3. 花; 4. 雌蕊和花萼; 5. 花冠剖开, 示雄蕊着生位置; 6. 雄蕊; 7. 核果。8—14. 梗花粗叶木 *Lasianthus biermanni* King ex Hook. f. ssp. *biermanni*: 8. 花枝; 9. 花; 10. 花冠剖开, 示雄蕊着生位置; 11. 雌蕊和花萼; 12. 核果; 13. 核果横切; 14. 分核。(余汉平绘)