

起；叶柄长约4—8毫米，稍粗壮，近无毛；托叶革质，三角形，长约1.2—1.5毫米。花无梗或近无梗，簇生于叶腋；萼管长约1.5毫米，檐部稍扩大，浅4裂，裂片阔三角形，长约0.3—0.4毫米，无毛或疏被缘毛；花冠白色，芽时棒状，长约8.5毫米，仅里面喉部被柔毛，檐部4裂，裂片近卵形，比冠管稍短；雄蕊4，生冠管喉部，花丝短，花药长2.5—3毫米；子房4室，每室有1颗胚珠，花柱伸至冠管喉部，柱头4裂，裂片粗厚，长1—1.2毫米。核果扁球形，长约4—5毫米，宽约6—7毫米，分核4，背部有疣凸。

产海南各地。模式标本采于海南乐东尖峰岭。

本种的分核背部密生小瘤体，易与我国产本属其他种类相区别。

11. 焕镠粗叶木 (华南植物学报)

Lasianthus chunii Lo in Bot. Journ. South China 2: 10, fig. 3. 1993.

灌木，高1—3米；小枝黑褐色，密被短硬毛。叶厚纸质或近革质，披针形、长圆状披针形或近圆形，长通常8—15厘米，宽2—5.5厘米，顶端渐尖，基部楔尖或钝，全缘，干时上面灰绿色，下面紫棕色，上面无毛，下面中脉、侧脉和横行小脉上均被短硬毛；中脉在上面压入，下面凸起呈半柱状，侧脉每边约7—8条，下面凸起；叶柄长0.5—1厘米或稍过之，密被短硬毛；托叶小，近三角形，长1—1.5毫米，密被短硬毛。花近无梗或有短梗，常2—4朵簇生叶腋；苞片很小或没有；萼管陀螺状，密被短硬毛，长约2毫米，檐部扩展，裂片6，近三角形，长约1毫米；花冠白色或微染红色，芽时棒状，盛开时管状漏斗形，外面被短硬毛，管长约9—10毫米，里面中部以上被长柔毛，裂片6，披针形，长3—3.5毫米，顶端内弯，有一距状长喙，里面被疏毛；雄蕊6，生冠管喉部，花丝短，花药线形，长2毫米，稍伸出；子房6（—7）室，花柱长约9—10毫米，柱头长1.5—2毫米。核果扁球形，长约5毫米，被短硬毛，成熟时黑色，含6（—7）个分核，核的基部喙状。

产江西寻乌和福建德化、湖南宜章、广东（南部以外）各地和广西容县。模式标本采于广东乐昌。

本种与 *L. chinensis* (Champ.) Benth. 相似，区别是本种叶下面中脉、侧脉和横行小脉上均被硬毛；中脉在上面压入；花冠管状漏斗形。

12. 粗叶木 (海南植物志) 图版 22: 1—5

Lasianthus chinensis (Champ.) Benth. Fl. Hongk. 160. 1861; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 187. 1880; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 388. 1888; Dunn & Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. add. ser. 10: 134. 1912; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 176. 1927; Hand.-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl. LVI, Abt. B: 465. 1937; Liu & Chao in Taiwania 10: 124, fig. 4. 1964; 海南植物志 3: 337. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 247, 图 5908. 1975; 台湾植物志 4: 286, 图 1005. 1978; H.