

据记载为白色或淡紫色，被毛。果近球形，直径约 6 毫米，淡黄色，无毛，冠以宿存萼齿；分核 4 或 5 个。 花期 9 月。

产海南定安和琼中、云南西南部至东南部。生于海拔 1200—2400 米的林下。分布于印度尼西亚（爪哇和西里伯斯）、泰国、印度东北部（阿萨姆）和越南北部。

18. 库兹粗叶木（华南植物学报） 勐腊粗叶木（植物分类学报）

Lasianthus kurzii Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 183. 1880; Craib, Fl. Siam. Enum. **2** (1): 212. 1934; Deb et Gang. in Journ. Econ. Tax. Bot. **15** (2): 288. 1991; Lo in Bot. Journ. South China **2**: 1. 1993.

18a. 库兹粗叶木（原变种）

var. *kurzii*

灌木；枝淡红褐色，平滑，叶柄及叶下面的脉上被贴伏的灰白色短柔毛。叶椭圆状长圆形或披针形，长 8—20 厘米，宽 2—5 厘米，顶端渐尖，基部短尖，干时苍白褐色，上面平滑；侧脉 9—10 对，小脉直而平行，不呈网状；叶柄长 6—8 毫米；托叶长圆状披针形，长 6—8 毫米，被短柔毛。花束腋生，外层的苞片卵形，里面的披针形，无毛或被缘毛；花无梗，被糙伏毛；萼檐扩大，5 或 6 裂，裂片披针形；花冠漏斗状，长约 4 毫米，纤细。核果很小，无毛；分核 5—7 个。 花期 2—3 月，果期 6—7 月。

分布于印度的安达曼群岛、缅甸和泰国。生于低海拔地区。我国不产。

18b. 宽昭粗叶木（变种）（华南植物学报） 图版 18: 8—10

var. *howii* Lo in Bot. Journ. South China **2**: 2. 1993. — *L. kurzii* auct. non Hook. f: H. Zhu in Acta Phytotax. Sinica **32** (1): 60. 1994 (quoad specimen Yunnan).

与原变种的区别是叶下面被贴伏的锈色柔毛；托叶三角形；苞片被贴伏的锈色柔毛。

产云南沧源和西双版纳。生于海拔 550—1200 米处的林下。分布于泰国。模式标本采于云南勐腊。

18c. 林生粗叶木（变种）（华南植物学报）

var. *sylicola* Lo in Bot. Journ. South China **2**: 2. 1993. — *L. kurzii* Hook. f. var. *fulvus* C. Y. Wu et H. Zhu in Acta Phytotax. Sinica **32** (1): 60. 1994, syn. nov.

与原变种的区别是小枝和叶下面被伸展的锈色硬毛；托叶三角形；苞片被伸展的锈色硬毛；果通常亦被毛。

我国特有，产海南各地和云南西双版纳。生于海拔 300—1200 米处的林下。模式标本采于海南白沙。

19. 线萼粗叶木（植物分类学报） 图版 26: 7—8