

Lasianthus linearisepalus C. Y. Wu et H. Zhu in Acta Phytotax. Sinica **32** (1): 61, fig. 1. 1994.

灌木，高约1米；小枝初被糙毛，很快变无毛。叶纸质，长圆形，长7—11厘米，宽2.5—3厘米，顶端尾尖，基部楔形，通常两侧不对称，上面无毛，下面脉上被糙毛；侧脉每边5—6条，小脉近平行，两面凸起，中脉和侧脉两面压扁；叶柄长5毫米，散生糙毛；托叶很小，三角形，长1毫米。花1—3朵腋生；苞片钻形，长2—3毫米；萼裂片5（—6），线形，被长糙毛，不等长，长的达8毫米，明显长于萼管；花冠外面被长毛。果球形，冠以宿萼裂片。花期10月。

我国特有，产云南腾冲。海拔1880—2020米。

20. 长萼粗叶木（华南植物学报）

Lasianthus longisepalus Geddes in Kew Bull. **1928**: 245. 1928; Craib, Fl. Siam. Enum. **2** (1): 213. 1934; Lo in Bot. Journ. South China **2**: 3. 1993.

20a. 长萼粗叶木（原变种）

var. ***longisepalus***

灌木，高约2米；枝和叶下面密被黄色绒毛。叶椭圆形至长圆形，长11—15厘米；侧脉每边约11条，上面压入；叶柄长1—1.5厘米，粗厚，被黄色绒毛。花无柄，单生叶腋；萼管长5—6毫米，裂片5—7，线形，长13—14毫米；花冠白色，管长约13毫米，裂片通常5，披针形，长8毫米，顶端反折；花柱5—7裂，长11毫米。

分布于泰国的 Chantaburi，我国不产。

20b. 尖峰粗叶木（变种）（华南植物学报）

var. ***jianfengensis*** Lo in Bot. Journ. South China **2**: 4. 1993. ——*L. longisepalus* auct. non Geddes: H. Zhu in Acta Phytotax Sinica **32** (1): 63. 1994. ——*L. chevalieri* auct. non Pitard: Li in Journ. Arn. Arb. **25**: 214. 1944.

灌木，高2—3米；小枝、叶柄、叶下面和果实均被黄色绒毛。叶纸质，长圆形或披针状长圆形，长12—16厘米，宽3—4厘米，顶端渐尖或尾状渐尖，基部阔楔尖，近全缘，上面绿灰色，稍有光泽，无毛或中脉上被贴伏硬毛；中脉在上面不压入，在下面凸起，侧脉常每边12条，呈锐角斜升，上面明显，不压入，下面凸起；小脉纤细，近平行；叶柄粗壮，长约8毫米；托叶近三角形，长3—5毫米，密被绒毛。花无梗，1—4朵簇生叶腋，无苞片；萼管长约3毫米，裂片5或有时6，线形，长9—11毫米；花冠未见。核果卵圆形，长约5—6毫米，宽约7毫米，成熟时黄色，被绒毛，有5或6分核。果期冬季。

产海南尖峰岭。生于海拔850—1450米的山谷灌丛中。

21. 黄果粗叶木（新拟）

Lasianthus calycinus Dunn in Kew Bull. **1912**: 367. 1912; Merr. in Lingnan Sci.