

状披针形，长约2—2.5毫米，顶端内弯，盛开时反折或伸展；雄蕊5，生冠管喉部，花丝短，花药微伸出；花柱伸至冠管口部，与花药等高。核果近球形或卵球形，径约5毫米，成熟时蓝色或紫蓝色，有5颗分核。花期夏初至秋初，果期秋冬。

产台湾、广东、广西东部和南部及云南（富宁、勐腊）。散生于密林。分布于日本（琉球）。模式标本采于台湾。

24. 西南粗叶木（中国高等植物图鉴） 蒙自鸡屎树（云南种子植物名录）

Lasianthus henryi Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 401. 1916; Lév. Cat. Pl. Yunnan 246. 1917; Chung in Mem. Sci. Soc. China **1**: 239. 1924; H. Zhu in Acta Phytotax. Sinica **32** (1): 76. 1994.

灌木，高1—2米，有时小乔木状，高达4米；小枝常近长，密被贴伏的绒毛。叶纸质，长圆形或长圆状披针形，有时椭圆状披针形，长8—15厘米或稍过之，宽约2.5—5.5厘米，顶端渐尖或短尾状渐尖，常稍钝头，基部钝或圆，有缘毛，干时两面近灰色，上面无毛，下面中脉、侧脉和横行小脉上被贴伏或稍伸展的硬毛状柔毛；侧脉6—8对，弧状斜升，横行小脉纤细，近平行，下面凸起，上面不很明显；叶柄长不超过1厘米，密被硬毛；托叶小，近三角形，长1—2毫米，短尖，被毛，常脱落。花近无梗或具极短梗，2—4朵簇生叶腋；苞片很小，长1—2毫米，或无苞片；萼被柔毛或硬毛，管陀螺状，长约1.5毫米，檐部5裂，裂片钻状，长1.5—2毫米；花冠白色，外面被硬毛，狭管状，喉部略膨大，管长约7毫米，里面中部以上被白色长柔毛，裂片披针形，长约3毫米，宽1—1.2毫米，渐尖，里面被柔毛；雄蕊5，生冠管喉部，花丝短，花药线形，长1.2毫米；花柱长7毫米，柱头线状，长0.8毫米。核果近球形，径6—8毫米，成熟时蓝色，无毛，含5个分核。

我国特有，产四川（乐山和峨眉山、筠连、壁山、屏山、长宁）、贵州、云南东南部至西南部。常生林缘或疏林中。模式标本产云南蒙自。

25. 钟萼粗叶木（中国高等植物图鉴） 图版 25: 1—4

Lasianthus trichophlebus Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 388. 1888; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. add. ser. **10**: 134. 1912, p. p.; 中国高等植物图鉴 **4**: 247, 图 5907. 1975; H. Zhu in Acta Phytotax. Sinica **32** (1): 70. 1994.

灌木，高1—2米；枝近圆柱状，干时红褐色，被糙伏毛，节间的毛稀疏，节上很密。叶纸质，长圆形，有时长圆状倒披针形，长8—14厘米，宽2.5—4厘米或稍过之，顶端骤尖或短渐尖，基部楔形或稍钝，有时两侧稍不对称，边全缘或微浅波状，干时通常灰色或褐灰色，上面无毛，下面中脉和侧脉上密被伸展的长硬毛，横行小脉上被稀疏硬毛；中脉在上面微压入，下面凸起，侧脉每边7—9条，斜升或弧状斜升，小脉近平行；叶柄长不超过1厘米，被糙伏毛；托叶披针状三角形，长约6—8毫米，密被长硬毛；无苞片。核果无梗，2至多个簇生叶腋，卵圆形，长7—8毫米，被伸展硬毛，成