

常生林缘或疏林中，常见。分布于日本（琉球）和菲律宾（吕宋）。模式标本产广东罗浮山。

26b. 毛枝粗叶木（变种）（华南植物学报）

var. *trichocladus* Lo in Bot. Journ. South China **2**: 7. 1993.

本变种与原变种的主要区别点是小枝密被贴伏柔毛；侧脉通常每边 5—7 条。

产广东西部及南部和中部、海南、广西东部和南部。模式标本产广西钦州。

27. 日本粗叶木（植物分类学报）

*Lasianthus japonicus* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. **3**: 110. 1867; Matsum et Hayata, Enum. Pl. Formos. 197. 1906; Kanehira, Formos. Trees ed. 2, 718. 1936; Simizu in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa **34**: 302. 1944; Liu et Chao in Taiwaniana **10**: 134, fig. 10. 1964; 台湾植物志 **4**: 295, 图 1011. 1978; H. Zhu in Acta Phytotax. Sinica **32** (1): 76. 1994. — *L. hartii* Franch. in Bull. Soc. Bot. France **46**: 209. 1899; Merr. in Lingnan Sci. Journ. **13**: 49. 1934; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **16**: 323. 1935. et l. c. **18**: 249. 1937; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7** (4): 1022. 1936. et in Beih. Bot. Centralbl. 56. Abt. B: 465. 1937; Ferguson in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **32** (1): 109. 1972; 中国高等植物图鉴 **4**: 249, 图 5912. 1975. — *L. areolatus* Dunn in Journ. Bot. **47**: 376. 1909. — *Canthium dunnianum* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **9**: 324. 1911. — *L. caudatifolius* Merr. in Journ. Arn. Arb. **8**: 18. 1927. — *L. taiheizanensis* Masam. et Suzuki in Journ. Soc. Trop. Agr. Taihoku **2**: 49. 1930; Kanehira, Formos. Trees ed 2, 671. 1936. — *L. nebulosa* Simizu in Journ. Jap. Bot. **8**: 237. 1937. — *Mephitidia japonica* (Miq.) Nakai, Trees & Shrubs Jap. ed 2, 524. fig. 238. 1927. — *Mephitidia taiheizanensis* Matsum. et Suzuki in Journ. Soc. Trop. Agr. Taihoku **2**: 49. 1930; Masam. Short Fl. Formos. 203. 1936.

27a. 日本粗叶木（原变种）

var. *japonicus*

灌木；枝和小枝无毛或嫩部被柔毛。叶近革质或纸质，长圆形或披针状长圆形，长 9—15 厘米，宽 2—3.5 厘米，顶端骤尖或骤然渐尖，基部短尖，上面无毛或近无毛，下面脉上被贴伏的硬毛；侧脉每边 5—6 条，小脉网状，罕近平行；叶柄长 7—10 毫米，被柔毛或近无毛；托叶小，被硬毛。花无梗，常 2—3 朵簇生在一腋生、很短的总梗上，有时无总梗；苞片小；萼钟状，长 2—3 毫米，被柔毛，萼齿三角形，短于萼管；花冠白色，管状漏斗形，长 8—10 毫米，外面无毛，里面被长柔毛，裂片 5，近卵形。核果球形，径约 5 毫米，内含 5 个分核。

产安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川和贵州。生于