

本种与 *L. fordii* Hanca 非常相似, 区别只是叶小; 枝通常被毛。

31. 伏毛粗叶木 (植物分类学报)

Lasianthus appressihirtus Simizu in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa **34**: 300. 1934; Musam. List. Vasc. Pl. Taiwan 177. 1954; Liu et Chao in Taiwania **10**: 119, fig. 1. 1964; 台湾植物志 **4**: 284, 图 1003. 1978; H. Zhu in Acta Phytotax. Sinica **32** (1): 64. 1994. — *L. formosensis* Matsum. var. *parvifolius* Hatusima in Sci. Bull. Agric. Home Econom. Univ. Ryukyu **3**: 23. 1956. — *L. inconspicuous* Hook. f. var. *hirtus* Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 401. 1916. — *L. appressihirtus* Simizu var. *maximus* Simizu ex Liu et Chao in Taiwania **10**: 121, fig. 2. 1964; 台湾植物志 **4**: 284. 1978, syn. nov.

灌木, 高 1—1.5 米; 枝和小枝密被贴伏的硬毛或柔毛。叶具等叶性, 叶片近革质或纸质, 长圆形或倒披针状长圆形, 长 7—8 厘米, 宽 1.5—2.5 厘米, 顶端骤然渐尖, 基部短尖, 上面无毛, 下面中脉、侧脉和横行小脉上均被贴伏的硬毛; 侧脉 7—8 对, 小脉近平行; 叶柄长 5—8 毫米, 被贴伏的短柔毛; 托叶小。花无梗, 常 2—3 朵簇生叶腋; 苞片小, 被硬毛; 萼钟状, 被硬毛, 长 2—2.5 毫米, 5 裂不达中部, 裂片长三角形; 花冠白色, 近管状, 长约 8 毫米, 外面无毛, 里面被长柔毛, 裂片 5, 近卵形, 里面被毛; 雄蕊 5, 生冠管喉部, 具短的花丝; 花柱近无毛, 伸至冠管口。核果无毛, 有 5 个分核。

产福建南靖、台湾北部、广东 (怀集、清远、乳源、英德、高州、从化、博罗、丰顺)、广西 (凌云、靖西、大苗山、苍梧)、四川 (峨眉山、乐山、屏山)、贵州兴仁、云南 (盈江、碧江、保山、绥江、景洪、西畴、砚山、麻栗坡、金平、文山、屏边)。生于阔叶林中。分布于日本 (琉球)。模式标本采于我国台湾台北。

据刘棠瑞和赵哲明先生报道 (Taiwania 10: 121. 1964) 本种尚有一变种 var. *maximus* Simizu ex Lu et Chao, 它的主要异点是叶较大, 长 9—11 厘米, 宽 2.5—4 厘米。由于差异并不太大, 产地和生境也相同, 刘、赵甚至将同一号标本 H. Simizu 2778 定作不同的变种, 故编者认为这个变种无存在的必要。

32. 虎克粗叶木 (植物分类学报) 图版 27: 1—4

Lasianthus hookeri C. B. Clarke ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 184. 1880; Brandis, Ind. Trees 397. 1906; Kanjilal et Das, Fl. Assam **3**: 92. 1939; Deb et Gang. in Journ. Econ. Tax. Bot. **15** (2) 285. 1991; H. Zhu in Acta Phytotax. Sinica **32** (1): 71. 1994.

32a. 虎克粗叶木 (原变种)

var. ***hookeri***

灌木或小灌木, 高约 1—2 米; 嫩枝方柱状, 老枝圆柱状, 密被微柔毛或糙伏毛。