

产云南南部（沧源和勐腊）。生于海拔 500—700 米处的林下。分布于印度东北部。

34. 美脉粗叶木（华南植物学报） 图版 22: 6

Lasianthus lancifolius Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 187. 1880; Kanjilal et Das, Fl. Assam **3**: 92. 1939; Kar et Panigrahi in Bull. Bot. Surv. Ind. **5**: 231. 1963; Deb et Gang. in Journ. Econ. Tax. Bot. **15** (2): 289. 1991; Lo in Bot. Journ. South China **2**: 6. 1993; H. Zhu in Acta Phytotax. Sinica **32** (1): 71. 1994.


灌木，高 2—3 米，有时小乔木状，高达 6 米；枝近圆柱状，微有条纹，灰褐色或灰色，被贴伏的微柔毛，毛稠密或稀疏。叶二列，具等叶性，纸质，狭披针形或线状披针形，很少近披针形，长 11—25 厘米，有时达 30 厘米，宽约 2—4.5 厘米或稍过之，顶端渐尖，基部钝或圆，上面无毛，下面脉上多少被贴伏的微柔毛或柔毛，干时灰褐色；中脉在上面常压入，下面凸起，侧脉纤细，每边约 8—10 条，下面凸起，小脉常分枝呈网状，纤细而雅致；叶柄长 0.7—10 毫米，很少达 15 毫米，被毛同小枝；托叶小，三角形，长约 2 毫米，基部阔，向上骤尖，略被毛。花无梗或具长约 1 毫米的花梗，2 至多朵簇生，腋生或着生在老枝无叶节上；苞片极小或无；萼倒圆锥状，上部扩大呈杯状，多少被贴伏微柔毛，管长约 1.5 毫米，裂片 5，三角形，长约 0.5 毫米，通常边缘被绒毛；花冠淡红色或白色，狭漏斗形，外面被短硬毛，管长 9—10（—12）毫米，狭窄，里面中部以上被长柔毛，裂片 5，三角状卵形，长约 2 毫米，顶端内弯，有一长约 0.5 毫米的喙；雄蕊 5，生冠管喉部，内藏，花丝短，花药长圆形，长约 1 毫米；花柱未见。核果近球形，径约 6—7 毫米，被疏硬毛，成熟时蓝色，含 5 个分核。花期 7—12 月，果期 11 月至翌年春季。

产广东西部和海南、广西各地、云南南部和东南部。生于海拔 550—1700 米处的山地林中。分布于印度东北部和越南北部。

76. 石核木属 *Litosanthes* Bl.

Bl. Cat. Gew. Buitenz. 21—22. 1823 et in Flora **8**: 189. 1825 (*Lithosanthes*); DC. Prodr. **4**: 465. 1830; Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. **2**: 131. 1873; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **IV** (4): 121. 1891——*Lithosanthes* A. Rich. Mem. Soc. Nat. Hist. Paris **5**: 213. 1829. ——*Lasianthus* Jack Sect. *Lithosanthes* Ridl. Fl. Malay Penins. **2**: 151. 1923.

直立灌木。叶对生，二列，具短柄；托叶极小或退化消失。花小，具短梗，通常 2 朵聚生于腋生、纤细的总花梗末端，有小苞片承托；萼小，萼管陀螺形，倒卵形或卵形，檐部 4 裂；花冠壶形，里面喉部被长柔毛，檐部 4 裂，裂片里面被短柔毛，芽时覆



图版 22 1—5. 粗叶木 *Lasianthus chinensis* (Champ.) Benth.: 1. 花枝; 2. 花; 3. 花冠剖开, 示雄蕊着生位置; 4. 雌蕊和花萼; 5. 核果。6. 美脉粗叶木 *Lasianthus lancifolius* Hook. f.: 6. 叶上下面, 示毛被。

(余汉平绘)