

1. 蒋英木 (华南农学院学报) 图版 29

Tsiangia hongkongensis (Seem.) But, Hsue et P. T. Li in *Blumea* **31** (2): 311. 1986. —*Gaertnera hongkongensis* Seem. Bot. Voy. Herald 384. 1857. —*Sykesia hongkongensis* (Seem.) O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. **2**: 425. 1891.

灌木或小乔木, 节间幼时稍被毛, 干后呈不规则的突起的筋纹。叶对生, 近无柄, 革质, 宽倒卵形至匙形, 长 3—6 厘米, 宽 1—2 厘米, 顶端钝, 基部渐狭, 无毛; 中脉极明显, 侧脉每边 3—5 条, 斜伸向上, 在叶缘附近连合再分出小脉至叶缘; 托叶草质, 分离或基部连合, 近截头形, 长约 1.5 毫米。花序单生或二歧分枝的聚伞花序, 具总花梗; 花 4 基数; 花梗被毛, 长 3—4 毫米, 基部有三角形微细小苞片; 花萼长约 1 毫米, 萼檐裂片广卵形至三角形, 长约 0.8 毫米, 顶端钝, 腹面有棕红色的附属体; 花冠辐形, 冠管长 2 毫米, 直径 0.8—1 毫米, 裂片膜质, 宽倒卵形, 长 8—9 毫米, 宽 5 毫米, 干后呈现明显网状脉; 雄蕊生于冠管喉部, 与花冠裂片互生, 花药 2 室, 长约 2 毫米, 花丝扁平, 长 0.3—0.5 毫米, 宽 0.2 毫米; 子房上位, 2 室, 每室有胚珠数粒, 花柱 2 裂, 短于花冠管或与花冠管等长, 柱头带形。果未见。

产香港。

族 14. 鸡矢藤族 Trib. 14. Paederieae DC.

DC. Prodr. **4**: 342, 470. 1830; Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. Pl. **2**: 9, 25. 1873; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **IV** (4): 125. 1891; S. P. Darwin in Taxon **25** (5/6): 605. 1976.


藤本或乔木和灌木, 稀草本。叶对生; 托叶生于叶柄间, 离生, 花冠裂片镊合状排列; 雄蕊着生在花冠喉部, 少生于花冠基部; 子房常 2—5 室, 花柱 2—5 裂, 裂枝常为丝状, 柱头常有乳头状突起; 珠孔向下; 胚珠上升, 直立, 倒生, 着生在子房室的基底。蒴果或为小坚果, 有时肉质, 分核常从中柱悬垂; 种子具向下的胚根, 胚乳多或少, 常肉质。

模式属: 鸡矢藤属 *Paederia* Linn.

本族约有 5 属、94 种。分布于亚洲的热带和亚热带地区, 极少数分布于其他热带地区。我国有 4 属、48 种。

78. 鸡矢藤属 *Paederia* Linn. nom. cons.

Linn. Syst. Nat. ed. 12, 2: 135, 189. [Linn. Mant. Pl.



图版 29 蒋英木 *Tsiangia hongkongensis* But, Huse et P. T. Li: 1—4. 叶片; 5. 托叶; 6. 花蕾; 7. 花冠展开; 8. 花萼展开; 9. 花萼裂片, 示 4 条附属体; 10. 雄蕊; 11. 雌蕊; 12. 子房模切面。(余汉平绘)