

缘、沟谷边灌丛中或缠绕在灌木上。分布于朝鲜、日本、印度、缅甸、泰国、越南、老挝、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚。

本种叶的形状和大小变异很大。根据中草药汇编，本种主治风湿筋骨痛、跌打损伤、外伤性疼痛、肝胆及胃肠绞痛、黄疸型肝炎、肠炎、痢疾、消化不良、小儿疳积、肺结核咯血、支气管炎、放射反应引起的白细胞减少症、农药中毒；外用治皮炎、湿疹、疮疡肿毒。

11b. 毛鸡矢藤 (变种) (广州植物志)

var. *tomentosa* (Bl.) Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7 (4): 1023. 1936. et in Beih. Bot. Centralbl. 56 (B): 465. 1937; 广州植物志 514. 1956. — *P. tomentosa* Bl. Bijdr. 963. 1826.

本变种与原变种 (鸡矢藤) 的区别是：小枝被柔毛或绒毛；叶上面被柔毛或无毛，下面被小绒毛或近无毛；花序常被小柔毛；花冠外面常有海绵状白毛。花期夏、秋。

产江西、广东、香港、海南、广西、云南等省区。生长环境和鸡矢藤同。

有些学者认为本变种为 *P. tomentosa* Bl.；有些人认为与 *P. tomentosa* (Lour.) Merr. 是同一种。Heinrich von Handel-Mazzetti；则恢复 Blume 的 *P. tomentosa* Bl.，但作为鸡矢藤 *P. scandens* 的一个变种。作者认为 Handel-Mazzetti 的处理比较接近自然。

79. 香叶木属 *Spermadictyon* Roxb.

Roxb. Pl. Corom. 3: 32, t. 236. 1815.

直立灌木，揉之发臭。叶对生，具柄；托叶短，在叶柄间，宿存。花排成顶生、三歧分枝的圆锥花序或伞形花序式的聚伞花序；萼管卵形，萼檐5裂，裂片锥形，宿存；花冠漏斗形，冠管长而直，顶部5裂，裂片长圆形，镊合状排列；雄蕊5，生于冠管喉部，花丝短，锥形，花药中部以下背着，内藏；苞片和小苞片锥状披针形；花盘枕形；子房5室，具5槽，隔膜很快消失，花柱线形，柱头5裂；胚珠每室单个，由基部直立倒生。蒴果顶端5裂；种子长圆形或三棱形，种皮具网状纹；胚直立，子叶叶状心形，胚茎圆柱形，向下。

属模式： *S. suaveolens* Roxb.

本属约6种，分布于印度、马来西亚。我国有1种，可能由印度引入。

1. 香叶木 (中国种子植物科属辞典) 网纹茜 (西藏植物志)

Spermadictyon suaveolens Roxb. Pl. Corom. 3: 32, t. 236. 1815; Hara et Gould in Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 208. 1979; 西藏植物志 4: 452. 1985. — *Hamiltonia suaveolens* Roxb. Hort. Beng. 15. 1814, nom. nud.

亚灌木，高1—3米，有广歧多少草质的枝。叶椭圆状披针形或卵形，长13—20厘米