


28. 托叶边缘常有腺体; 花冠白色或淡红色, 柱头 3 裂 27. 大果野丁香 *L. wilsoni* Hort. ex Diels
25. 柱头多于 3 裂。
29. 花冠裂片近卵形, 顶端内折成喙状 28. 拉萨野丁香 *L. hirsutiflora* Lo
29. 花冠裂片卵状披针形, 顶端短尖或稍钝。
30. 叶稍厚; 小苞片顶端骤然渐尖; 萼裂片三角状披针形; 花冠裂片顶端短尖, 边缘反卷 29. 瓦山野丁香 *L. parvifolia* Hutchins.
30. 叶纸质, 边缘明显背卷; 小苞片顶端骤然短尖; 萼裂片长圆状卵形; 花冠裂片顶端稍钝 30. 甘肃野丁香 *L. purdomii* Hutchins.
24. 小苞片明显长于花萼。
29. 柱头常 3 裂 31. 西藏野丁香 *L. xizangensis* Lo
29. 柱头常 5 裂。
30. 叶两面无毛
31. 托叶三角形, 无毛; 花近无梗; 萼裂片被流苏状缘毛; 花冠淡紫色, 狭漏斗形; 裂片披针形; 雄蕊生冠管喉部上方 32. 黄杨叶野丁香 *L. buxifolia* Lo
31. 托叶卵状三角形, 被软毛; 花梗长 3—5 (8) 毫米; 萼裂片被短缘毛; 花冠紫蓝色, 漏斗形, 裂片阔卵形, 雄蕊生冠管喉部下方 33. 文水野丁香 *L. diffusa* Batalin
30. 叶两面被毛, 至少在边上被缘毛。
32. 叶仅上面中脉上被缘毛, 下面脉上散生刚毛。
33. 托叶扁三角形或三角形, 顶端渐尖, 尖头罕具 1 或 2 个侧生腺齿; 萼裂片顶端渐尖 20. 川南野丁香 *L. handeliana* H. Winkl. ex Hand. -Mazz.
33. 托叶阔三角形, 顶端骤尖, 具小尖头; 萼裂片顶端钝至截平 34. 川滇野丁香 *L. pilosa* Diels
32. 叶上面被糙硬毛 35. 华山野丁香 *L. huashanica* Lo
1. 丽江野丁香 (云南种子植物名录) 图版 31: 1—5

Leptodermis dielsiana H. Winkl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 18: 151. 1922; 云南种子植物名录, 下册: 1259. 1984.

矮小灌木, 高 8—50 厘米, 生有根状鞭毛; 新枝尚未木化, 变红色, 被微柔毛, 老枝变无毛, 有灰色树皮, 短枝长 3—10 毫米, 有时更长, 有 2 对或较长的有 3 对叶。叶在长枝上疏生, 在侧生短枝上密生, 在二种枝条下部的叶均小, 有时近圆形, 长 6—15 毫米, 宽 4—12 毫米, 上部的卵形或长圆形, 长 10—30 毫米, 宽 5—15 毫米, 顶端短尖或稍钝, 有一细尖头, 基部渐狭成长 2—6 毫米的柄, 上面、叶柄和中脉上被微柔毛, 其余部分被圆锥状毛, 下面无毛或在脉上疏生毛; 侧脉 3—5, 弧状联接; 托叶膜质状草质, 长约 1.5 毫米, 脉 2 条, 先端汇接, 与边缘离开, 上部特别是花序的托叶压扁三



图版 31 1—5. 丽江野丁香 *Leptodermis dielsiana* H. Winkl.: 1. 花枝; 2. 短柱花花冠剖开, 示雄蕊和花柱; 3. 长柱花花冠剖开, 示雄蕊和花柱; 4. 小苞片; 5. 果实。6—12. 矮小野丁香 *Leptodermis pumila* Lo: 6. 花枝; 7. 花; 8. 花剖开, 示雌雄蕊; 9. 小苞片; 10. 果; 11. 托叶; 12. 叶。13—18. 绵毛野丁香 *Leptodermis lanata* Lo: 13. 花枝; 14. 花; 15. 花剖开, 示雌雄蕊; 16. 花冠裂片背面; 17. 小苞片; 18. 叶。(余汉平绘)

角形，短渐尖，靠近先端有2个腺齿，另2个稍离开，下部托叶通常无此腺齿，基部被缘毛，其余被极短微柔毛。花1—3朵生于极短枝之顶，有时在上部一对叶的叶腋中有1或2朵侧生，花梗有乳头状糙毛；小苞片2，长2.5—3.5毫米，分离，无梗，透明，褐色的中脉和稀疏的侧脉是贯顶的，卵状长圆形或长圆形，具细尖，上部被缘毛，被微柔毛，比萼长；萼裂片5，很少6，近膜质，有脉纹，长圆形，具细尖或稍钝，被缘毛；花冠大，长15—17毫米，管阔漏斗形，几不弯，外面近基部被极短乳头状微毛，里面被长柔毛，基部无毛，裂片比管短3—4倍，卵状圆形，长4—5毫米，最后又开，决不反折，中间部分的两边较薄，边缘波状，外面无毛，里面被长柔毛；雄蕊生冠管喉部，花丝着生在花药的中部，其游离部分比花药基部稍长，花药线状，内藏或半伸出；花柱5裂，无毛，裂片较长，有长乳凸，内藏或伸出。果未见。花期5月。

产云南大理、永宁、丽江一带。

2. 撕裂野丁香（新拟）

Leptodermis scissa H. Winkl. in Handl.-Mazz. Symb. Sin. 7: 1024. 1936.

灌木，高20—50厘米，偶达1.5米；小枝灰色或褐色，被短绒毛。叶于小枝上密生，纸质，长圆状卵形或阔卵形，下部叶长5—8毫米，宽2.5—4毫米，上部叶长15—23毫米，宽7—13毫米，顶端具细尖，基部渐狭，干时近灰色，两面近无毛，或上面中脉、侧脉和边缘均被极短的硬毛，略显粗糙，中脉上的毛很密，下面无毛；侧脉每边3—4条，劲直；托叶近膜质，上部的短三角形，下部的长三角形，向上腺体状渐尖，有时附有1或2个腺齿，脉2条，于顶部汇接，最上部的短而阔，骤然渐尖，无脉，全部托叶外面被短绒毛，里面有腺状附属体。花常3朵在短枝上顶生，有短梗或两侧的有稍长的梗，此外在节上每一叶腋中有花1—3朵；小苞片卵形，分离几达基部，边缘交叠，透明，渐尖，长2.8—3毫米，仅褐色中脉被短毛，其余近无毛，有缘毛，其尖头几与萼等长或较短；萼长3—3.2毫米，裂片5，三角形，常多少散生柔毛，有缘毛；冠管长约11毫米，漏斗状，微弯，外面无毛或被微柔毛，里面被长柔毛，近基部无毛，裂片卵状圆形，长约2毫米，外面无毛；短柱花雄蕊5，生冠管喉部，花药线形，约一半伸出，里面被腺状长柔毛；花柱5裂，内藏，无毛。果卵状，长约4毫米，假种皮与种皮明显分离。花期7—8月，果期10月。

产四川（德昌、米易、西昌、木里）、云南（德钦、兰坪、丽江等地）。生于1500—2500米的灌丛中。模式标本采自四川德昌。

3. 聚花野丁香（云南种子植物名录） 图版32: 1—9

Leptodermis glomerata Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. 3: 406. 1916; Lévl. Cat. Pl. Yunnan 246. 1917; H. Winkl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 18: 165. 1922; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1: 240. 1924; 云南种子植物名录，下册: 1259. 1984.