

Leptodermis pumila Lo in Journ. Trop. Subtrop. Bot. 7 (1): 18. 1999.

矮小灌木，高5—10厘米；主根粗壮，木质，棕褐色；枝较短，多节，被微柔毛。叶于短枝上部密生，纸质，椭圆形或长圆形，有时近倒卵形，长5—15毫米，宽3—7毫米，顶端短尖，基部楔尖，两面中脉和侧脉上疏生柔毛；侧脉约3—4对，下面微凸；叶柄长约1—2毫米；托叶厚，三角形，长1.5—2毫米，密被柔毛和短缘毛。花无梗，3朵簇生短枝之顶；小苞片2，中部以下合生，上部分离，近三角形，被柔毛，比萼稍短或近等长；萼管倒圆锥形，长约1.8毫米，裂片5，近卵形，长约1毫米，顶端短尖，被短缘毛；花冠淡红色，漏斗形，管长1.1—1.2厘米，外面被密柔毛，里面被长柔毛，裂片5，长约3.5毫米，有阔而薄的边缘；雄蕊5，生冠管喉部下方，花丝短，花药线形，长约3毫米，稍伸出；花柱长7—8毫米，柱头3，丝状，长约2毫米。果未见。花期5月。

我国特有，产于云南丽江。生于草坡上，海拔3000米，常见。

本种的体形极似 *L. dielsiana*，区别是小苞片中部以下合生，花冠外面密被柔毛。

6. 短萼野丁香 (热带亚热带植物学报) 图版 32: 10—15

Leptodermis brevisepala Lo in Journ. Trop. Subtrop. Bot. 7 (1): 21. 1999.

灌木，高约40厘米；小枝圆柱状，直而长，锈褐色，被短柔毛或微柔毛。叶疏生或在小枝顶部4片簇生，厚纸质，卵形或披针形，长6—10毫米，宽3—5毫米，顶端短渐尖或近短尖，很少圆钝，边缘略反卷，两面无毛，干时上面近黑色，下面暗褐色；中脉和每边3—4条侧脉均在下面明显凸起；叶柄长1—2毫米，有时近无柄；托叶近三角形，长约1.6毫米，顶端具一长的硬尖头，近无毛。聚伞花序几无总梗，在短枝上顶生，偶有腋生，有花5—7朵；花无梗或有短梗；小苞片透明，中部之下合生，顶端有一刺状硬尖头，近无毛或被微柔毛，与萼管近等长；萼管长约1.4—1.7毫米，干时黑色，裂片5，卵状圆形或卵状三角形，长宽近相等，约0.4毫米，顶端钝或近短尖，无缘毛；花冠白色，漏斗形，长8—10毫米，外面被微柔毛，里面密被白色长柔毛，裂片5，近圆形，中间部分较厚，边檐薄而阔，波状或啮蚀状；雄蕊5，着生在冠管喉部下方，花药线形，内藏；花柱伸出，柱头常3裂，曲卷。果未见。

本种近 *L. potanini* Batalin，区别是萼裂片卵状圆形或卵状三角形，长宽近相等；花冠较小，长8—10毫米，白色。

产四川会理。生于海拔1750米处。

7. 毛花野丁香 (热带亚热带植物学报)

Leptodermis velutiniflora Lo in Journ. Trop. Subtrop. Bot. 7 (1): 17. 1999.

7a. 毛花野丁香 (原变种)

var. ***velutiniflora***

灌木，高0.5—1米；小枝圆柱状，细长坚挺，密被短柔毛。叶纸质，椭圆形至长