

细，劲直，有时刺状，灰色，被微柔毛；叶厚纸质，长圆形至椭圆形，有时阔椭圆形，长3—10毫米，宽2—5毫米，顶端短尖或稍钝，基部楔形或渐狭，边缘常稍反卷，两面近无毛，上面略有光泽；中脉在下面凸起，侧脉极不明显；叶柄短或近无柄；托叶三角状卵形或卵状披针形，比叶柄稍长，顶端具短尖头，边缘有或无小齿，被缘毛。花近无梗，1—3朵簇生于枝顶和近枝顶的叶腋；小苞片2，1/2—2/3合生，分离部分呈二唇形，全长3—4毫米，透明，裂片顶端尾状渐尖，边上有疏缘毛；萼长约2—2.5毫米，裂片5，长圆状披针形，约与萼管近等长或稍短，短渐尖，被缘毛；花冠紫红色，有香气，漏斗形，长11—14毫米，外面被微柔毛，里面被长柔毛，裂片4—5，卵状披针形，长约3毫米；雄蕊4—5，生冠管喉部上方，花药线形，稍伸出；花柱长约为冠管之半，柱头3，丝状。果长3—3.5毫米；种子覆有与种皮分离的网状假种皮。花果期7—8月。

我国特有，产内蒙古和宁夏的贺兰山一带。常生岩石裂缝中，海拔约1600米。模式标本采自内蒙古伊克昭盟的鄂托克旗棋盘井。

10. 糙叶野丁香（西藏植物志） 图版33: 6—13

Leptodermis scabrida Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 199. 1881; 西藏植物志 4: 456. 1985.


灌木，高1—1.5米；枝粗壮，褐色或暗灰色，短枝基部常密生许多鳞片状宿存托叶，被柔毛。叶长圆状披针形或长圆形，有时狭披针形，长1—3厘米，偶达4厘米，宽4—10毫米，顶端短尖至渐尖，基部楔尖或下延，两面被糙毛或下面仅中脉和侧脉上被毛；中脉在下面凸起，侧脉每边3—4条，不很明显；叶柄短或近无柄；托叶近三角形，有长而外弯的硬尖头，被柔毛。花近无梗，3—5朵顶生和近枝顶腋生；小苞片透明，被柔毛，长3—4毫米，约2/3合生，分离部分三角状卵形，顶端有硬尖头；萼管长约2毫米，裂片长0.5—0.7毫米，宽大于长或长宽近相等，钝头，被密缘毛；花冠白色，漏斗形，长9—10毫米，外面被柔毛，裂片5，近披针形，长约2—2.5毫米；长柱花的雄蕊生冠管喉部下方，花药线形，内藏；长柱花的花柱稍伸出，柱头3裂，丝状，外弯。蒴果长5—6毫米；种子未见，据原记载假种皮与种皮分离。花期6月。

产西藏东南部的察隅（据《西藏植物志》记载）和南部的樟木。生于林下或山坡，海拔2400—2600米。分布于印度阿萨姆。

11. 吉隆野丁香（新拟） 图版34: 1—6

Leptodermis kumaonensis Parker in Ind. For. 48: 576. 1922; Hara et Gould in Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 204. 1979.

灌木，高1—2米，有时达3米；小枝圆柱状，常紫色，被腺质柔毛。叶纸质，长圆状披针形或卵状披针形，生于长枝上的长3—10厘米，宽约1—2.5厘米，生于短枝的长通常不超过1.5厘米，顶端近渐尖，基部阔楔尖，全缘，通常有缘毛，干时上面黑



图版33 1—5. 野丁香 *Leptodermis potanini* Batalin var. *potanini*: 1. 花枝; 2. 花; 3—4. 花剖开, 示雌雄蕊; 5. 苞片。6—13. 糙叶野丁香 *Leptodermis scabrida* Hook. f.: 6. 花枝; 7. 花; 8—9. 花剖开, 示雌雄蕊; 10. 萼展开; 11. 苞片展开; 12. 茎节, 示托叶; 13. 叶上下面。(余汉平绘)