

果长 5—6 毫米，种子有网状、与种皮分离的假种皮。花期 6—8 月，果期 10 月。

产我国华北，西至陕西汉中(?)南至河南北部，尤以河北最常见。生于山坡、路边等向阳处，亦见于灌丛中。模式标本产北京或其邻近地区。

本种叶和花的大小常有变异，因此，H. Winkl. 将叶和花较大的类型建立一变种 var. *leptophylla* H. Winkl. 似无必要。此外，产于日本的 *L. pulchella* Yatabe 与上述变种几无区别，因此也很可能应归并于本种。

过去有的文献记录本种也分布至湖北，陕西等地。据目前所见标本，多为鉴定错误所造成的。

15. 柔枝野丁香 (新拟)

Leptodermis gracilis C. E. C. Fischer in Kew Bull. 1940: 293. 1941.

15a. 柔枝野丁香 (原变种)

var. *gracilis*

灌木，高 1.5—2 米；枝细长，常俯垂，灰白，被短柔毛。叶对生，纸质，椭圆形至披针形，长 1.4—3.5 厘米，宽 5—13 毫米，顶端短尖，基部楔尖，多少下延，上面除中脉和边缘有时疏被糙硬毛外无毛，铅灰色，下面略苍白，中脉和侧脉上常被毛，边缘有短糙硬毛状缘毛；叶柄长 2—6 毫米；托叶生叶柄间，长骤尖，基部阔，长 3 毫米，被微柔毛和缘毛。聚伞花序顶生和于小枝上部腋生，总花梗长 3.5 毫米；花无柄，3 朵簇生；苞片狭椭圆状披针形，长 4 毫米，短尖，被缘毛；小苞片 2，合生成长约 2.5 毫米的鞘，分离部分阔卵形，长约 1—1.5 毫米，具短尖头，3 脉；萼管陀螺状，5 棱，长 1.2—1.5 毫米，裂片 5，长圆形，顶部圆或近截平，长约 1.2 毫米，被缘毛；花冠白色或紫色，狭漏斗状，管纤细，长 8 毫米，里面基部以上被柔毛，裂片 5，剑形，长 1.5 毫米，近短尖；雄蕊 5，着生在冠管喉部，花药无柄，线形，长 1.5 毫米，内藏；花柱纤细，柱头 3，丝状，长 1—1.5 毫米，有小乳头，稍伸出。蒴果线状长圆形，长 5 毫米，5 瓣裂；种子脱落。花期 7 月。

产西藏波密和察隅、墨脱。常生于海拔 1000—2400 米处的山坡。模式标本采自西藏察隅河。

15b. 长花野丁香 (变种)

var. *longiflora* Lo in Addenda 338. 1999.

本变种与原变种的区别是花大，花冠长 16 毫米。花期 7 月。

产四川马尔康卓克基。生于海拔 2650 米处的灌丛中。

16. 卵叶野丁香 (新拟)

Leptodermis ovata H. Winkl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 18: 162. 1922; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 15: 427. 1936. —*L. oblonga* auct. non Bunge: Hance in Journ. Bot. 20: 290. 1882; Dunn & Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. add.