

果长 5—6 毫米，种子有网状、与种皮分离的假种皮。花期 6—8 月，果期 10 月。

产我国华北，西至陕西汉中(?)南至河南北部，尤以河北最常见。生于山坡、路边等向阳处，亦见于灌丛中。模式标本产北京或其邻近地区。

本种叶和花的大小常有变异，因此，H. Winkl. 将叶和花较大的类型建立一变种 var. *leptophylla* H. Winkl. 似无必要。此外，产于日本的 *L. pulchella* Yatabe 与上述变种几无区别，因此也很可能应归并于本种。

过去有的文献记录本种也分布至湖北，陕西等地。据目前所见标本，多为鉴定错误所造成的。

15. 柔枝野丁香 (新拟)

Leptodermis gracilis C. E. C. Fischer in Kew Bull. 1940: 293. 1941.

15a. 柔枝野丁香 (原变种)

var. *gracilis*

灌木，高 1.5—2 米；枝细长，常俯垂，灰白，被短柔毛。叶对生，纸质，椭圆形至披针形，长 1.4—3.5 厘米，宽 5—13 毫米，顶端短尖，基部楔尖，多少下延，上面除中脉和边缘有时疏被糙硬毛外无毛，铅灰色，下面略苍白，中脉和侧脉上常被毛，边缘有短糙硬毛状缘毛；叶柄长 2—6 毫米；托叶生叶柄间，长骤尖，基部阔，长 3 毫米，被微柔毛和缘毛。聚伞花序顶生和于小枝上部腋生，总花梗长 3.5 毫米；花无柄，3 朵簇生；苞片狭椭圆状披针形，长 4 毫米，短尖，被缘毛；小苞片 2，合生成长约 2.5 毫米的鞘，分离部分阔卵形，长约 1—1.5 毫米，具短尖头，3 脉；萼管陀螺状，5 棱，长 1.2—1.5 毫米，裂片 5，长圆形，顶部圆或近截平，长约 1.2 毫米，被缘毛；花冠白色或紫色，狭漏斗状，管纤细，长 8 毫米，里面基部以上被柔毛，裂片 5，剑形，长 1.5 毫米，近短尖；雄蕊 5，着生在冠管喉部，花药无柄，线形，长 1.5 毫米，内藏；花柱纤细，柱头 3，丝状，长 1—1.5 毫米，有小乳头，稍伸出。蒴果线状长圆形，长 5 毫米，5 瓣裂；种子脱落。花期 7 月。

产西藏波密和察隅、墨脱。常生于海拔 1000—2400 米处的山坡。模式标本采自西藏察隅河。

15b. 长花野丁香 (变种)

var. *longiflora* Lo in Addenda 338. 1999.

本变种与原变种的区分是花大，花冠长 16 毫米。花期 7 月。

产四川马尔康卓克基。生于海拔 2650 米处的灌丛中。

16. 卵叶野丁香 (新拟)

Leptodermis ovata H. Winkl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 18: 162. 1922; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 15: 427. 1936. —*L. oblonga* auct. non Bunge: Hance in Journ. Bot. 20: 290. 1882; Dunn & Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. add.

ser. 10: 134. 1912.

灌木，有少数上升的分枝，高约0.5—3米；嫩枝被短硬毛，很快变无毛，覆有灰色的树皮；叶疏生，近革质，卵形、卵状长圆形至长圆形，长1.5—6厘米，宽1—2.2厘米，有时达3厘米，顶端通常短渐尖或短尖，基部渐狭，上面无毛或中脉上被短硬毛，下面脉上被短硬毛或无毛；侧脉每边4—7条，斜升，上面凹或平扁，常不明显，下面明显可见或有时不明显；叶柄通常较长；托叶质坚硬，极短约1毫米长，阔三角形，具一短尖头，无毛或边上有短硬毛。花顶生，3—7朵排成一行，近无柄，此外在上部3—6对叶的叶腋中生花3—7朵，甚至形成一长的花枝；小苞片坚硬，透明，长圆形，长2.5—3.5毫米，钻状渐尖，有脉纹，2/3合生或过之，被硬毛，开花时比萼稍长或近等长；萼裂片5，近圆形，长约0.5毫米，宽几大于长，边缘彼此微叠生，有纵脉纹，被缘毛；花冠管长约9—10毫米，狭漏斗形，微弯，被绒毛至疏柔毛，裂片5，比管短4—5倍，约长1.5—1.8毫米，长圆形，中间部分比狭窄边缘厚，顶端内弯；短柱花的雄蕊生冠管中部之上，花丝在花药1/3处着生，分离部分比花药下部长；花柱3—5裂，无毛。蒴果长约6毫米；种子有网状、与种皮分离的假种皮。花期10月，果期11月。

产广东北部、广西西北部至东南部、云南东南部和南部。生于山坡旷地、石山或疏林中，海拔约1000—1500米。模式标本采自广东连县。

17. 北川野丁香 (热带亚热带植物学报)

Leptodermis bechuanensis Lo in Journ. Trop. Subtrop. Bot. 7 (1): 17. 1999.

灌木，高约2米；枝纤细，圆柱状，灰色或灰褐色，被二列柔毛。叶纸质，狭披针形或长圆状披针形，有时近卵形或椭圆形，长0.8—3.5厘米，宽0.3—1厘米，顶端渐尖或短尖，基部楔尖，干时榄绿色，上面微粗糙，下面中脉上被短糙毛；中脉和侧脉两面微凸起，侧脉每边约3—4条；叶柄长1—3毫米；托叶小，近三角形，长约1毫米，有硬尖头，常脱落。花1—3朵顶生，无梗；小苞片鳞片状，长不达1毫米，有硬尖头；萼管长约1.8毫米，萼裂片阔三角形，宽大于长；长约0.6毫米，有时边缘有小齿；花冠未见。果（未成熟）近倒卵形，长约3毫米；种子有与种皮贴生的假种皮。

产四川（北川青片羌藏脚，磨房沟）。海拔1350米。

本种近 *L. forrestii*，区别是萼裂片小，阔三角形；托叶小，常脱落，叶干时榄绿色。

18. 绵毛野丁香 (热带亚热带植物学报) 图版 31: 13—18

Leptodermis lanata Lo in Journ. Trop. Subtrop. Bot. 7 (1): 19. 1999.

灌木，高0.5—1米；枝粗壮，圆柱状，紫红色，近无毛，短枝基部密覆许多鳞片状宿存托叶。叶在短枝上密生，厚纸质，椭圆形或倒卵形，有时长圆形，长5—10毫米，宽2—4毫米，顶端短尖，基部楔尖，边缘反卷，上面被短绒毛，下面被灰白色绵