

ser. 10: 134. 1912.

灌木，有少数上升的分枝，高约0.5—3米；嫩枝被短硬毛，很快变无毛，覆有灰色的树皮；叶疏生，近革质，卵形、卵状长圆形至长圆形，长1.5—6厘米，宽1—2.2厘米，有时达3厘米，顶端通常短渐尖或短尖，基部渐狭，上面无毛或中脉上被短硬毛，下面脉上被短硬毛或无毛；侧脉每边4—7条，斜升，上面凹或平扁，常不明显，下面明显可见或有时不明显；叶柄通常较长；托叶质坚硬，极短约1毫米长，阔三角形，具一短尖头，无毛或边上有短硬毛。花顶生，3—7朵排成一行，近无柄，此外在上部3—6对叶的叶腋中生花3—7朵，甚至形成一长的花枝；小苞片坚硬，透明，长圆形，长2.5—3.5毫米，钻状渐尖，有脉纹，2/3合生或过之，被硬毛，开花时比萼稍长或近等长；萼裂片5，近圆形，长约0.5毫米，宽几大于长，边缘彼此微叠生，有纵脉纹，被缘毛；花冠管长约9—10毫米，狭漏斗形，微弯，被绒毛至疏柔毛，裂片5，比管短4—5倍，约长1.5—1.8毫米，长圆形，中间部分比狭窄边缘厚，顶端内弯；短柱花的雄蕊生冠管中部之上，花丝在花药1/3处着生，分离部分比花药下部长；花柱3—5裂，无毛。蒴果长约6毫米；种子有网状、与种皮分离的假种皮。花期10月，果期11月。

产广东北部、广西西北部至东南部、云南东南部和南部。生于山坡旷地、石山或疏林中，海拔约1000—1500米。模式标本采自广东连县。

17. 北川野丁香 (热带亚热带植物学报)

Leptodermis bechuanensis Lo in Journ. Trop. Subtrop. Bot. 7 (1): 17. 1999.

灌木，高约2米；枝纤细，圆柱状，灰色或灰褐色，被二列柔毛。叶纸质，狭披针形或长圆状披针形，有时近卵形或椭圆形，长0.8—3.5厘米，宽0.3—1厘米，顶端渐尖或短尖，基部楔尖，干时榄绿色，上面微粗糙，下面中脉上被短糙毛；中脉和侧脉两面微凸起，侧脉每边约3—4条；叶柄长1—3毫米；托叶小，近三角形，长约1毫米，有硬尖头，常脱落。花1—3朵顶生，无梗；小苞片鳞片状，长不达1毫米，有硬尖头；萼管长约1.8毫米，萼裂片阔三角形，宽大于长；长约0.6毫米，有时边缘有小齿；花冠未见。果（未成熟）近倒卵形，长约3毫米；种子有与种皮贴生的假种皮。

产四川（北川青片羌藏脚，磨房沟）。海拔1350米。

本种近 *L. forrestii*，区别是萼裂片小，阔三角形；托叶小，常脱落，叶干时榄绿色。

18. 绵毛野丁香 (热带亚热带植物学报) 图版 31: 13—18

Leptodermis lanata Lo in Journ. Trop. Subtrop. Bot. 7 (1): 19. 1999.

灌木，高0.5—1米；枝粗壮，圆柱状，紫红色，近无毛，短枝基部密覆许多鳞片状宿存托叶。叶在短枝上密生，厚纸质，椭圆形或倒卵形，有时长圆形，长5—10毫米，宽2—4毫米，顶端短尖，基部楔尖，边缘反卷，上面被短绒毛，下面被灰白色绵