

短绒毛，里面密生腺体状附属体。花5—7朵生于枝条之顶，近无柄，而且最高节上的每一叶腋也有1或3朵，次一节上具1或2分枝，枝顶有花朵，二歧状顶生；苞片，特别是中央一朵的多少叶状，长4—5毫米，渐尖，有中肋和网状脉，被绒毛，中部以下合生，多少比萼长；萼长约3毫米，裂片5，卵形，渐尖，无齿，有缘毛；幼嫩花冠外面被短硬毛；柱头5裂。花期6月。

我国四川特有，产于盐源瓜必。

本种的模式标本只有花蕾，以叶较小，小苞片比萼长等特征来看，很可能是 *L. pilosa* Diels 的同物异名。

21. 蒙自野丁香 (新拟)

Leptodermis tomentella H. Winkl. [in Fedde, Repert. Sp. Nov. **18**: 159. 1922, nom. nud.] ex Lo——*L. pilosa* auct. non Diels: Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 405. 1916, quoad specim. A. Henry 10974.

灌木；茎、枝和叶的两面均被短绒毛，小枝粗壮，圆柱形，上部的短，下部的近长，第二次分枝极短。叶厚纸质，卵形或椭圆形，长5—19毫米，宽2.5—10毫米，顶端短尖，有一硬短尖头，基部阔楔形，干时带褐色；侧脉每边2—3条，很少4条，上面不明显，下面稍凸起；叶柄短而粗厚；托叶三角形，长约1—1.5毫米，顶端有刺状硬尖。花3—7朵簇生小枝之顶，近无柄；小苞片卵形，长约3毫米，顶端有一刺状尖，约1/3合生，被绒毛，比萼裂片略短；萼管干时黑色，裂片淡褐色，卵状长圆形，长约1.5毫米，顶端微钝，有缘毛；花冠紫色或白色，漏斗形，长1.2—1.3厘米，外面被绒毛，里面喉部被长柔毛，裂片有宽阔、柔薄的边檐；雄蕊5，生冠管喉部，花丝极短，花药线形，长约2.5毫米；花柱伸出，柱头5裂，裂片线形。蒴果长约5毫米，假种皮网状，与种皮粘连。花期5—6月，果期9月。

产云南（蒙自和澄江）。生于海拔1500—2000米处的山坡，不常见。模式标本采自蒙自。

22. 白毛野丁香 (新拟)

Leptodermis rehderiana H. Winkl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **18**: 157. 1922.

灌木，高1—2米，极多分枝，全株被白色长柔毛或柔毛；小枝纤长。叶纸质，披针状长圆形或卵状长圆形，有时近卵形，长1—4厘米，宽达2厘米，顶端短尖或短渐尖，有时钝，基部渐狭，干时褐灰色；侧脉每边约3—5条，下面微凸；叶柄长达1厘米；托叶质坚，长约2毫米，上部的短渐尖，下部的刺状渐尖。花于带叶的枝上顶生，5—7朵排成一行，中间的无梗，两侧的明显有梗，在小枝上部4—5节上常有2—3朵花腋生，下部的2或1个节上的成花序状，有总梗；小苞片透明，长圆形，长2.5至3毫米，顶端钻状渐尖，有脉纹，约2/3合生，上部被极短柔毛，余无毛，比萼稍长；萼长约2.5—2.8毫米，裂片5，极短尖，被缘毛，有纵脉；花冠管极狭的漏斗形，长