

本变种与原变种 (var. *hirsutiflora*) 的区别是花冠被短柔毛, 萼裂片除边上被缘毛外无毛。

产西藏加查。生于海拔 4100 米处灌丛中。

29. 瓦山野丁香 (新拟) 图版 37: 1—8

Leptodermis parvifolia Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. 3: 404. 1916; H. Winkl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 18: 155. 1922.


直立或平卧灌木, 高可达 1.5 米, 通常 0.5—1 米; 小枝短或稍长, 干时灰色或嫩枝带红色, 被微柔毛, 很快变无毛。叶稍厚, 匙状卵形或倒披针形, 有时近卵形或椭圆形, 长 0.5—1 厘米或稍过之, 宽 2—5 毫米, 顶端钝或近短尖, 基部渐狭; 侧脉每边约 3 条, 通常不明显; 叶柄短; 托叶钻状渐尖, 长约 1 毫米。花于枝顶单生或 2—3 朵簇生, 无梗; 小苞片对生, 膜质, 卵形, 长约 1.5 毫米, 顶端骤然渐尖, 无毛, 比萼短; 萼管有直棱 10 条, 其中 5 条通至裂片弯内, 无毛, 裂片 5, 三角状披针形, 长 1.25 毫米, 顶端短尖, 被短缘毛; 冠管长 1.2 厘米, 上部扩大, 外面被微柔毛, 里面被疏柔毛, 裂片 5, 卵状披针形, 长约 2.5 毫米, 顶端短尖, 边缘反卷; 花药长 1.25 毫米, 稍伸出; 花柱与冠管等长, 无毛, 5 裂, 裂片纤细。蒴果长 4—5 毫米; 种子的网状假种皮与种皮紧贴或一端分离。花期 8—9 月。

产四川的峨边、宝兴、石棉、金阳、布拖、盐源、会东、美姑、昭觉、新龙、泸定、康定、奉节。生于向阳山坡上的灌丛中或林缘, 海拔 1500—3000 米。模式标本采于峨边瓦山。

30. 甘肃野丁香 (云南种子植物名录) 图版 37: 9—14

Leptodermis purdomii Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. 3: 405. 1916; H. Winkl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 18: 156. 1922; 中国高等植物图鉴 4: 254, 图 5922. 1975.

灌木, 高约 1—2 米; 小枝纤长, 嫩部被微柔毛, 很快变无毛。叶簇生, 纸质, 线状倒披针形, 长 0.5—1 厘米, 宽 1.5—3.5 毫米, 顶端钝, 基部渐狭, 边缘明显背卷, 两面无毛, 叶脉不明显; 托叶卵形, 长约 1.5 毫米。花无柄或近无柄, 干枝顶簇生; 小苞片 2 片, 膜质, 透明, 卵形, 对生, 基部合生, 背部有龙骨状突起, 顶端骤然短尖, 比萼短, 长约 1.5 毫米, 几无毛, 有白色针状线条; 萼管无毛, 裂片 5, 革质, 长圆状卵形, 长 1.5 毫米, 宽 0.75 毫米, 顶端三角状短尖, 被缘毛; 花冠粉红色, 狭漏斗形, 长 8—10 毫米, 管纤细, 微弯, 喉部稍扩大, 外面密被柔毛, 里面疏被长柔毛, 裂片 5, 卵状披针形, 长约 2 毫米, 顶端稍钝, 两面疏被柔毛; 雄蕊 5, 生冠管喉部, 花药线形, 长约 2 毫米, 长柱花的内藏, 短柱花的略伸出; 花柱纤细, 长柱花伸出, 短柱花伸达中部, 柱头 5 裂, 裂片线形。蒴果长 5 毫米, 种子的网状假种皮与种皮粘贴。花期 7—8 月, 果期 9—10 月。



图版 37 1—8. 瓦山野丁香 *Leptodermis parvifolia* Hutchins. 1. 花枝; 2. 花; 3. 短柱花剖开, 示雌雄蕊; 4. 长柱花剖开, 示雌雄蕊; 5. 苞片; 6. 苞片展开; 7. 茎的节部, 示托叶; 8. 叶上下面。9—14. 甘肃野丁香 *Leptodermis purdumii* Hutchins.: 9. 花枝; 10. 花; 11. 花冠剖开, 示雌雄蕊; 12. 苞片; 13. 托叶; 14. 叶上下面。

(余汉平绘)