

产四川乡城和小金，西藏察隅、八宿、隆子、加查、朗县、林芝和米林。生于灌丛中。

35. 华山野丁香 (热带亚热带植物学报)

Leptodermis huashanica Lo in Journ. Trop. Subtrop. Bot. 7 (1): 16. 1999.

灌木；枝细长，覆有灰白色薄片状外皮，稍老外皮脱落，褐红色，均无毛。叶疏生，很少在短枝上簇生，薄革质，披针形至卵形，有时长圆形或椭圆形，长 7—15 毫米，宽 3—6 毫米，顶端钝或近短尖，基部楔尖，边缘反卷，上面常有不规则皱纹，散生糙硬毛，下面无毛或中脉上疏生短硬毛；侧脉两面均不明显或上面明显压入；叶柄长约 1 毫米；托叶三角状披针形，长约 1.5—2 毫米，渐尖，靠近边缘有 2 条形、于顶端汇接的脉。花无梗，常 3 朵簇生枝顶；小苞片薄干膜质，透明，约 2/3 合生，长约 4.5 毫米，顶端骤尖，并有一刺状尖头，有时渐尖；萼管长约 2.5 毫米，裂片近卵形，长约 0.7 毫米，短渐尖，被短缘毛；花冠漏斗形，长约 9—10 毫米或稍过之，冠管纤细，多少弯曲，被微柔毛，裂片近卵形，长约 2.5 毫米，顶端内弯，外面无毛；雄蕊生冠管喉部上方，花药线形，半伸出；花柱内藏。花期 6 月。

我国特有，仅见于陕西华山。

81. 假盖果草属 *Pseudopyxis* Miq.

Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 3: 189. 1867; Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 135. 1873; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV (4): 127. 1891.

多年生小型草本，被紧贴的短柔毛或疏生多细胞的柔毛；根茎匍匐，地上茎直立，圆柱形或方形。叶对生，具柄，宽卵形或卵状心形，羽状脉，叶柄间的托叶膜质，宽三角形，有齿或缺刻，宿存。花白色或紫红色；聚伞花序腋生或顶生；苞片有短柄，宿存；萼筒短，近球形，顶端 5 裂，萼裂片卵状披针形，宿存，果时增大，有明显的网脉；花冠细管状漏斗形，喉部无毛或有毛，5 裂，裂片开展，宽卵形，内向镊合状排列；雄蕊 5 枚，着生于花冠管的基部，花丝极短，背着药，内藏；花盘肉质，位于萼筒的上方，包被着子房；子房 4—5 室，每室具一倒生的胚珠，花柱细长，柱头 4—5 裂，略伸出。果实小，冠以星状开展的萼裂，成熟后萼筒顶部似盖果状裂开；种子倒卵形，有纵沟。

属模式：P. depressa Miq.

本属有 2 种，产日本；我国有 1 种，产浙江。

1. 异叶假盖果草 (杭州大学学报) 图版 40

Pseudopyxis heterophylla (Miq.) Maxim. in Bull. Acad. Peterb. 29: 175. 1883;