

10. 海南虎刺 (植物分类学报)

Damnacanthus hainanensis (Lo) Lo ex Y. Z. Ruan, grad. nov. — *D. henryi* (Levl.) Lo ssp. *hainanensis* Lo in Acta Phytotax. Sinica **17** (3): 108. 1979.

无刺灌木，高1—4米，枝棕色，具棱，无毛。叶革质，干后黑色，椭圆状卵形、长圆形或长圆状披针形，长6—11厘米，宽2—4.5厘米，两面无毛，顶端骤尖，基部圆或楔形，边具反卷线；中脉两面凸出，侧脉每边5—7条，两面凸出；叶柄长2—8毫米，无毛；托叶生叶柄间，三角形，早落。花通常2朵生于腋生的短总梗上；苞片小，鳞片状；花梗长约2毫米；花萼杯状，顶截平，具三角形萼齿或萼齿不明显；花冠管状漏斗形，长约1.4厘米，外面无毛，内面自喉部至管上部被柔毛，檐部4裂，裂片卵状披针形；雄蕊4，着生于花冠喉部，花丝长约1毫米，花药长圆形，长约2毫米，外露；子房3—4室，花柱内藏，顶部4裂，裂片线形。核果扁圆形，直径约8毫米，具3—4分核，熟时红色。花期5月，果熟期11月。

海南特产。生于海拔800—1760米的林中和林缘。模式标本采自海南定安。

11. 云桂虎刺 (植物分类学报) 图版45: 7

Damnacanthus henryi (Lévl.) Lo in Acta Phytotax. Sinica **17** (3): 108. 1979. — *Canthium henryi* Levl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **13**: 178. 1914. — *Prismatomeris brevipes* Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 413. 1916. — *Prismatomeris linearis* Hutchins. ib. **3**: 414. 1916. — *Prismatomeris henryi* (Lévl.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. **16**: 328. 1935.

灌木，罕小乔木，高1.5—5米，通常无刺，有时顶叶托叶腋可具1短刺。枝具4棱，淡棕色，无毛。叶披针形、狭披针形或长圆形，纸质或革质，长5—13厘米，宽1—4厘米，两面无毛，顶端长渐尖，基部急尖或楔形，边缘具反卷线；中脉两面凸出，侧脉每边5—7条，在近边缘处弯拱相连，上面平，下面凸出，网脉在老叶两面不明显，在嫩叶下面明显；叶柄长2—5毫米，无毛；托叶生叶柄间，三角形，早落。花1—2对生于叶腋和枝顶叶腋位的短总梗上；苞片小，鳞片状；花梗长约2毫米；花萼钟状，长约1.5毫米，顶部截平，具萼齿4—5，萼齿钻形或披针形，大小不一；花冠白色或淡紫色，革质，管状漏斗形，长1.3—1.5厘米，外面无毛，内面自喉部至管上部被柔毛，檐部4裂，裂片卵状披针形，长约3毫米；雄蕊4，着生于花冠喉部，花丝长1—1.5毫米，花药长圆形，长2—2.5毫米，内藏；子房2室，花柱外伸，顶部2裂，裂片披针形或线形。核果具2分核，直径5—8毫米，熟时红色。花期10月，果熟期12月至次年2月。

产广西、贵州、云南等省区。生于海拔1200—1800米的山地密林中。模式标本采自云南。