

B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. **25**: 33. 1889.

1a. 四蕊三角瓣花 (原亚种)

ssp. **tetrandra**

产印度东北部 (模式产地); 分布至孟加拉国。我国不产。

1b. 多花三角瓣花 (亚种) (植物分类学报) 图版 42: 1—3

ssp. **multiflora** (Ridl.) Y. Z. Ruan in Acta Phytotax. Sinica **6**: 447. 1988. —

P. multiflora Ridl. in Kew. Bull. **1939**: 603. 1940.

与原亚种不同处为花序具花较多; 花梗较短; 萼檐通常无齿或不明显; 花丝极短或无。

灌木至小乔木, 高可达 8 米; 小枝四棱柱形。叶两面光滑无毛, 披针形或长圆状披针形, 长 8—17 厘米, 宽 3—6 厘米, 革质, 顶端渐尖或急尖, 基部楔状渐尖; 侧脉每边 5—9 条, 弯拱相连, 两面凸起; 叶柄长 5—15 毫米, 常具环纹; 托叶着生于叶柄间, 三角形, 脱落。花两性, 芳香, 2—16 朵簇生或排成具极短梗的伞形花序, 顶生或兼腋生; 苞片与托叶相似; 花梗长 5—15 毫米; 花萼杯形, 长 2—4 毫米, 无毛或有零星腺毛, 檐部截平, 几无萼齿; 花冠白色或淡紫色, 高脚碟形, 长 2—4 厘米, 管部长约 2 厘米, 檐部 4 (—5) 裂, 裂片长约 1 厘米, 披针形, 蕾时具棱, 镊合状排列; 雄蕊 4 (—5), 着生冠管上部, 花丝极短或无, 花药初时长圆形, 裂后线形, 长 3—4 毫米, 内藏或稍外露; 花柱通常内藏, 柱头不扩大, 2 裂, 裂片不粘连, 长约 4 毫米, 子房 2 室, 每室具胚珠 1 颗, 胚珠盾形, 着生于隔膜中至上部, 横生或下垂。核果近球形, 直径 8 毫米, 顶部具环状宿萼; 种子 1 (—2)。花期 5—9 月, 果期 9—12。

产云南南部。生于海拔 400—2400 米的林下或灌丛中。分布至泰国。

2. 南山花 (中国高等植物图鉴) 三角瓣花 (海南植物志)

Prismatomeris connata Y. Z. Ruan in Acta Phytotax. Sinica **6**: 447. 1988. —

P. tetrandra auct. non (Roxb.) K. Schum.; Merr. in Lingnan Sci. Journ. **5** (1—2): 178. 1927. et in Mitt. Bot. Hamburg, **7** (4): 300. 1937; Merr. et Chun in Sunyatsenia **1**: 81. et 182. 1930, p. p. quoad specim. Y. Tsiang 2342.; 海南植物志 **3**: 341. 1974, p. p.; 中国高等植物图鉴 **4**: 256, 图 5926. 1975.

2a. 南山花 (原亚种)

ssp. **connata**

灌木至小乔木, 高 2—8 米, 小枝四棱柱形。叶长圆形至披针形, 近革质, 有时卵形或倒卵形, 长 4—18 厘米, 宽 2—5 厘米, 全缘, 顶端渐尖或钝, 基部狭楔形; 侧脉每边 6—8 条, 两面凸起; 叶柄长 4—15 毫米; 托叶生叶柄间, 每侧 2 片, 初时钻形, 后下部加厚和连合成具 2 尖头的近三角形, 宿存。伞形花序顶生, 常兼侧生, 无梗或因顶叶脱落而成一假花序梗, 具花 3—16 朵; 花芳香, 两性, 偶单性; 苞片无或不明显;