

长圆形，着生子房隔侧基部。聚花核果近球形，直径6—10（—15）毫米，熟时橙红至桔红色；核果具分核2—4；分核三棱形，外侧弯拱，具种子1颗。种子与分核同形，角质，无毛。花期4—6月，果期7—8月。

产江西、福建、台湾、广东、香港、海南、广西等省区。生于平原路旁、沟边等灌丛中或平卧于裸地上；丘陵地的灌丛中或疏林下亦常见，但通常不分布至山地林内。分布于菲律宾和越南。

据载全株药用，有清热利湿、化痰止咳等药效。

20. 短柄鸡眼藤（新拟） 短柄巴戟天（海南植物志）

*Morinda brevipes* S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. 32: 399. 1951; 海南植物志3: 331. 1974.

20a. 短柄鸡眼藤（原变种）

var. *brevipes*

藤本；嫩枝密被短粗毛或短细毛，老枝无毛，棕色，稍木质化，直径约2毫米。叶厚纸质或近革质，倒卵状长圆形、倒卵形、倒披针形，有时披针形，长5—10（—13）厘米，宽2—3（—4）厘米，顶端渐尖或急尖，基部楔形，边全缘，上面干时草黄色或棕黑色，无毛，下面橄绿色、棕黄色或棕红色，无毛；中脉在上面平或稍隆起，无毛，在下面隆起，无毛或有不明显疏短毛；侧脉每边5—7条；叶柄长5—10毫米，上面披短粗毛；托叶筒状，顶端截平或鞘状（顶一侧向下斜裂），外面疏被短毛。花序4—9伞状排列于枝顶；花序梗长4—10毫米，被短硬毛，基部常有卵状或钻状总苞片1枚，长约3毫米；头状花序通常头状，有时呈圆锥体状或穗状，具花6—16朵；花无梗；花萼下部与邻近花合生，上部环状，顶端截平，无齿；花冠白色，长约5毫米，管部长约2.5毫米，直径约3毫米，檐部4—5裂，裂片长圆形，顶部具倒钩，内面中部以下至喉部密被髯毛；雄蕊与花冠裂片同数，互生，花药长圆形，开裂后变线形，长约1.5毫米，花丝长约3毫米；无花柱，柱头直接生于子房顶或具花柱，花柱长约5毫米，柱头2裂，长约1毫米，子房3—4室，每室具胚珠1颗。聚花核果由多花发育而成，近球形，直径10—12毫米，熟时橙黄或橙红色；核果具分核2—4，分核近三棱形，内具种子1颗；种子与分核同形、黑色、角质、无毛。花期4—5月，果熟期6—12月（有时至次年3月）。

海南特产，产南部和西部。生于海拔200至800米的丘陵地和山地。攀援或缠绕于灌木或乔木树干上。模式标本采自海南保亭。

20b. 狭叶鸡眼藤（变种）（新拟） 狭叶巴戟天（海南植物志）

var. *stenophylla* Chun et How ap. Ko in Fl. Hainan. 3: 581, 332. 1974.

与原变种不同处为：叶披针状线形，长7—11厘米，宽0.8—1.3厘米。花期5月。产海南乐东。生于丘陵地林下湿处。