

21. 南岭鸡眼藤

Morinda nanlingensis Y. Z. Ruan in Addenda 329. 1999.

21a. 南岭鸡眼藤 (原变种)

var. *nanlingensis*

藤本, 有时略呈灌木状; 嫩枝被短粗毛, 老枝无毛, 具棱, 稍木质, 紫蓝色。叶纸质或厚纸质, 通常无小型叶, 罕二型, 倒卵形、椭圆状倒披针形, 稀椭圆形, 长 7—9 (—12) 厘米, 宽 2—3.5 厘米, 顶端急尖、渐尖或具小短尖, 基部楔形, 全缘, 上面干时青棕色或深棕色, 初时疏被细短弯毛, 后变无毛, 中脉平, 有粒状短毛, 下面棕灰色, 无毛, 中脉隆起, 被粒状短毛; 侧脉每边 5—7 条, 斜升至边缘处; 叶柄长 3—5 毫米, 被粒状短粗毛; 托叶筒状, 膜质, 紧贴茎, 顶端近截平。花序 7—10 伞状排列于枝顶; 花序梗长 10—15 毫米, 被短柔毛; 头状花序具花 5—11 朵; 花 4—5 基数; 花萼倒圆锥状, 下部各花花萼彼此合生, 上部环状, 背面常具毛状苞片 1 枚, 顶端截平, 无齿; 花冠钟形, 厚, 稍肉质, 长约 5 毫米, 外面被粒状毛, 冠管长 2 毫米, 壶状, 檐部 4—5 裂, 裂片近披针形, 内面中部以下至喉部被髯毛; 雄蕊 4—5, 着生于花冠裂片侧基部, 花药长圆形, 长 1.5 毫米, 花丝长 1.5—2 毫米; 花柱长外伸, 柱头长圆形, 二裂, 外反, 或无花柱, 柱头生于子房顶, 子房稍露出萼外, 2—4 室, 每室具胚珠 1 颗。聚花核果由 4—8 花发育而成, 近球形, 直径 4—8 毫米, 熟时橙色至深红色; 分核三棱形, 具种子 1 颗; 种子与分核同形, 黑色, 角质。 花期 6 月, 果熟期 10 月。

产湖南西南部等南岭山脉地带和广东北部、广西东北部、云南南部。生于山谷、溪旁等山地疏林下或灌丛阴处。模式标本采自湖南莽山。

21b. 毛背鸡眼藤 (变种)

var. *pilophora* Y. Z. Ruan in Addenda 330. 1999.

与原变种不同处为叶下面密被柔毛。

产湖南西南部和广西东北部。生于山地林下或阴处灌丛中。模式标本采自湖南西南部。

21c. 少花鸡眼藤 (变种)

var. *pauciflora* Y. Z. Ruan in Addenda 331. 1999.

与原变种不同处为: 头状花序具花 3—4 (—7); 叶菱状披针形, 较小, 长 4—7 厘米, 宽 1.5—2.5 厘米。

产浙江南部。生于山地林下。模式标本采自杭州。

22. 金叶巴戟

Morinda citrina Y. Z. Ruan in Addenda 331. 1999.

22a. 金叶巴戟 (原变种)

var. *citrina*