

花多朵轮状簇生于托叶鞘内，无花梗，有丝状、透明、长于萼的小苞片；萼管极短，长不及1毫米；萼檐2裂，裂片线状披针形，与萼等长或略长；花冠白色，冠比萼短，顶部4裂，裂片与管近等长，无毛；花丝极短，花药长圆形。蒴果小，近椭圆形，略扁，长1—1.1毫米，直径0.8—1毫米，近无毛，成熟时从顶部向下开裂，隔膜脱落；种子椭圆形，两端钝，干后褐黄色，有光泽。 花果期几乎全年。

产香港和海南的儋县、万宁等县。为少见的矮小草本。分布于印度尼西亚（爪哇）和毛里求斯等地。

93. 盖裂果属 *Mitracarpus* Zucc. ex J. A. Schultes et J. H. Schultes

Zucc. ex J. A. Schultes et J. H. Schultes, Mant. 3: 210. (in obs.) 1827; Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 146. 1873; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam IV (4): 146. 1891.

直立或平卧草本；茎四棱形，下部木质。叶对生，披针形，卵形或线形；托叶生于叶柄间，不脱落。花两性，常常组成头状花序；萼管陀螺形，倒卵形或近圆形，萼檐杯形，顶部4—5裂，通常2枚裂片比其它的略长，宿存；花冠高脚碟形或漏斗形，冠管内部常具1环疏长毛，喉部无毛或被柔毛，裂片4，镊合状排列，开展；雄蕊4，生于冠管喉部，花药内藏或突出；花盘肉质；子房2室，罕有3室，花柱2裂，裂片线形，长或极短；胚珠每室1颗，生于隔膜中部盾形的胎座上。果双生，成熟时在中部或中部以下盖裂；种子长圆形或圆形，腹面平或4裂，胚乳肉质；子叶叶形，胚根向下。

属模式：M. scaber Zucc. ex J. A. Schultes et J. H. Schultes

本属约40多种，主要分布于热带美洲，其次是非洲和大洋洲；亚洲仅有2种，印度1种，我国1种，产海南。

1. 盖裂果（广西植物） 图版50

Mitracarpus villosus (Sw.) DC. Prodr. 4: 572. 1830; Rendle in Fl. Jam. 7: 127, fig. 39. 1936; Verdc. in Kew Bull. 30 (2): 317—322. 1975. et Fl. Trop. East Africa 375, fig. 55. 1976; Ko in Guihaia 6 (4): 261—262. 1986. —*Spermacoce hirta* Linn. Sp. Pl. ed. 2, 148. 1762. —*S. villosa* Sw. Prodr. Veg. Ind. Occ. 29. 1788. —*Mitracarpus scaber* Zucc. in Schultes Mant. Syst. Veg. 3: 210, 399. 1827. —*Staurospermum verticillatum* Schumach. et Thonn. Beskr. Guin Pl. 73. 1827. —*Mitracarpus senegalensis* DC. Prodr. 4: 572. 1830. —*M. verticillatus* (Schumach. et Thonn.) Vatke in Linnaea 40: 196. 1876; Sebastine et Ramanur-