

Galium sungpanense Cuf. in Oesterr. Bot. Zeitschr. **89**: 238. 1940.

草本，匍匐或上升，高约0.3米，柔弱；茎无毛，有时疏被微细的刺，节上无毛。叶纸质，6片轮生，有时5片，披针形或倒披针形、椭圆形，长3.5—10毫米，宽1.5—3.5毫米，顶端具硬尖，基部渐狭成短柄，两面无毛；在边缘和下面中脉上常有倒向的疏小刺和有时在上面近边缘处有疏小刺，1脉，叶柄长约1毫米。聚伞花序顶生于腋生的枝条上，1—3花，常2花，总花梗长达3厘米；花梗长5—10毫米；花冠小，宽不过1.5毫米；子房密被钩状糙硬毛。果双生，直径约2.5毫米，密被钩状糙硬毛，毛棕黄色，果柄长4—15毫米。 花果期7—9月。

产河北、四川。生于灌丛或草地，常见于荫湿处，海拔30—3300米。模式标本采自四川松潘。

组2. 原拉拉藤组 Sect. 2. *Aparine* DC. Prodr. **4**: 605. 1830, pro parte; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **IV** (4): 152. 1891, pro *Aparine* K. Schum.; Pobed. in Kom. Fl. URSS **23**: 304. 1958; F. Ehrendorfer in Bot. Journ. Linn. Soc. **70** (1): 5. 1975, pro syn. sub Sect. *Kolgyda* Dumort.

通常为一年生草本，常攀缘；茎粗糙，常具倒生的小刺。叶每轮6—8片，稀4—5片，相等，1脉，顶端具短尖头，常萎软状。聚伞花序腋生或顶生，少至多花，稀减少为单花，生在通常长的总花梗上；花两性，花冠辐状。果被钩毛或有小瘤状凸起，稀无毛，果柄直立或弓形下弯。

组模式：原拉拉藤 *G. aparine* Linn.

本组分2亚组。我国有1种、3变种。

分亚组检索表

1. 聚伞花序常向下弯；果柄弓形下弯…………… 1. 弯柄亚组 Subsect. **Camptopoda** Boiss.
1. 聚伞花序直立；果柄直立…………… 2. 直柄亚组 Subsect. **Leucaparinea** Boiss.

亚组 1. 弯柄亚组 Subsect. 1. *Camptopoda* Boiss. Fl. Orient. **3**: 67. 1875; Pobed. in Kom. Fl. URSS **23**: 304. 1958. ——*Camptaparine* K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **IV** (4): 152. 1891.

聚伞花序常向下弯；果有小瘤状凸起；果柄弓形下弯。

我国有1种。

14. 麦仁珠 (江苏南部种子植物手册) 弯梗拉拉藤 (西藏植物志) 图版 54:

Galium tricornes Stokes in With. Nat. Arr. Brit. Pl. ed. 2, 1: 153. 1787; DC. Prodr. 4: 608. 1830; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 207. 1881; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 395. 1888; E. Pritz. in Bot. Jahrb. 29: 583. 1901; Pampan. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. 17: 719. 1910; Cuf. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 89: 247. 1940; 江苏南部种子植物手册 712. 1959; 中国高等植物图鉴 4: 281. 1975; 西藏植物志 4: 465. 1985, pro parte; 秦岭植物志 1 (5): 24, 图 16. 1985; 黄土高原植物志 5: 25. 1989.

一年生草本，高 5—80 厘米，茎具 4 角棱，棱上有倒生的刺，少分枝。叶坚纸质，6—8 片轮生，带状倒披针形，长 1—3.2 厘米，宽 2—6 毫米，顶端锐尖，基部渐狭，常萎软状，干时常卷缩，两面无毛，在下面中脉和边缘均有倒生的小刺，1 脉，在下面凸起，无柄。聚伞花序腋生，总花梗长或短于叶，稍粗壮，有倒生的小刺，通常具 3—5 花，常向下弯；花小，4 数；花梗长 3—7 毫米，在花后较粗壮，具倒生的小刺，弓形下弯；花冠白色，辐状，直径 1—1.5 毫米，花冠裂片卵形；雄蕊伸出，花丝短；花柱 2，柱头头状。分果片近球形，单生或双生，直径 2—2.5 毫米，有小瘤状凸起，果柄较粗壮，弓形下弯。花期 4—6 月，果期 5 月至翌年 3 月。

产山西、陕西、甘肃、新疆、江苏、安徽、江西、河南、湖北、四川、贵州、西藏。生于山坡草地、旷野、河滩、沟边，海拔 450—3980 米。分布于印度、巴基斯坦、亚洲西部、欧洲、非洲北部、美洲北部。

亚组 2. 直柄亚组 Subsect. 2. *Leucaparinea* Boiss. Fl. Orient. 3: 68. 1875; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV (4): 153. 1891; Pobed. in Kom. Fl. URSS 23: 306. 1958.

聚伞花序直立；果被钩毛，稀无毛；果柄直立。

我国有 3 变种。

15. 原拉拉藤 (新拟)


Galium aparine Linn. Sp. Pl. 108. 1753; DC. Prodr. 4: 608. 1830; Cuf. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 89: 245. 1940; F. Ehrendorfer et F. Krendl in Fl. Europaea 4: 35. 1976; Hara in Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 200. 1979.

15a. 原拉拉藤 (原变种)

var. **aparine**

我国不产。分布于欧洲、亚洲西部、北美洲。

本种有 3 变种。



图版 54 1—4. 麦仁珠 *Galium tricorn Stokes*: 1. 果枝; 2. 叶; 3. 一段茎; 4. 果。5—8. 拉拉藤 *G. aparine* Linn. var. *echinospermum* (Wallr.) Cuf.: 5. 果枝; 6. 叶; 7. 一段茎; 8. 果。9—10. 纤细拉拉藤 *G. tenuissimum* M. Bieb.: 9. 果枝; 10. 果。(邓晶发绘)