

Galium tricornes Stokes in With. Nat. Arr. Brit. Pl. ed. 2, 1: 153. 1787; DC. Prodr. 4: 608. 1830; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 207. 1881; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 395. 1888; E. Pritz. in Bot. Jahrb. 29: 583. 1901; Pampan. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. 17: 719. 1910; Cuf. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 89: 247. 1940; 江苏南部种子植物手册 712. 1959; 中国高等植物图鉴 4: 281. 1975; 西藏植物志 4: 465. 1985, pro parte; 秦岭植物志 1 (5): 24, 图 16. 1985; 黄土高原植物志 5: 25. 1989.

一年生草本，高 5—80 厘米，茎具 4 角棱，棱上有倒生的刺，少分枝。叶坚纸质，6—8 片轮生，带状倒披针形，长 1—3.2 厘米，宽 2—6 毫米，顶端锐尖，基部渐狭，常萎软状，干时常卷缩，两面无毛，在下面中脉和边缘均有倒生的小刺，1 脉，在下面凸起，无柄。聚伞花序腋生，总花梗长或短于叶，稍粗壮，有倒生的小刺，通常具 3—5 花，常向下弯；花小，4 数；花梗长 3—7 毫米，在花后较粗壮，具倒生的小刺，弓形下弯；花冠白色，辐状，直径 1—1.5 毫米，花冠裂片卵形；雄蕊伸出，花丝短；花柱 2，柱头头状。分果片近球形，单生或双生，直径 2—2.5 毫米，有小瘤状凸起，果柄较粗壮，弓形下弯。花期 4—6 月，果期 5 月至翌年 3 月。

产山西、陕西、甘肃、新疆、江苏、安徽、江西、河南、湖北、四川、贵州、西藏。生于山坡草地、旷野、河滩、沟边，海拔 450—3980 米。分布于印度、巴基斯坦、亚洲西部、欧洲、非洲北部、美洲北部。

亚组 2. 直柄亚组 Subsect. 2. *Leucaparinea* Boiss. Fl. Orient. 3: 68. 1875; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV (4): 153. 1891; Pobed. in Kom. Fl. URSS 23: 306. 1958.

聚伞花序直立；果被钩毛，稀无毛；果柄直立。

我国有 3 变种。

15. 原拉拉藤 (新拟)

Galium aparine Linn. Sp. Pl. 108. 1753; DC. Prodr. 4: 608. 1830; Cuf. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 89: 245. 1940; F. Ehrendorfer et F. Krendl in Fl. Europaea 4: 35. 1976; Hara in Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 200. 1979.

15a. 原拉拉藤 (原变种)

var. **aparine**

我国不产。分布于欧洲、亚洲西部、北美洲。

本种有 3 变种。