

发状。果无毛，稀被毛。

组模式：G. viscosum Vahl

本组分 2 系。我国有 1 系 1 种。

纤细系 Ser. Tenuissima Pobed. in Kom. Fl. URSS **23**: 308. 1958. et in Nov. Syst. Pl. Vasc. **7**: 276. 1971.

花淡黄色。

系模式：纤细拉拉藤 G. tenuissimum M. Bieb.

我国有 1 种。

16. 纤细拉拉藤 (植物分类学报) 图版 54: 9—10

Galium tenuissimum M. Bieb. Fl. Taur.-Cauc. **1**: 104. 1808. et **3**: 107. 1819; DC. Prodr. **4**: 607. 1830; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 208. 1881; Pobed. in Kom. Fl. URSS **23**: 308, pl. 17. fig. 1. 1958; F. Ehrendorfer et F. Krendl in Fl. Europaea **4**: 36. 1976; W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **28** (4): 301. 1990.

一年生草本，高 30—50 厘米；茎直立，柔弱，常倒向地粗糙，无毛，具 4 角棱，分枝常叉开。叶纸质，每轮 4—8 片，线形，长常约 1 厘米，宽 0.5—1 毫米，顶端渐尖或短尖，茎部渐狭，沿边缘和在下面沿脉常具向上的刺毛，1 脉，具短柄或近无柄。聚伞花序腋生，大，疏松，纤弱，少花，分枝多；总花梗和花梗纤细，毛发状；花小，花梗长 5—17 毫米，无毛；花冠淡黄色，辐状，直径 1.5—2 毫米，花冠裂片 4，长圆状椭圆形，顶端尖；花药黄色，花丝短；花柱 2 裂。果小，长约 1 毫米，直径约 1.25 毫米，无毛，果片双生或单生。 花果期夏秋。


产新疆 (新源)。生于山地阳坡。分布于欧洲、亚洲 (中部、西部、西南部)。

组 4. 聚伞拉拉藤组 Sect. 4. Cymogaliae Pobed. in Kom. Fl. URSS **23**: 712. 1958. et op. cit. 326; Pobed. in Nov. Syst. Pl. Vasc. **7**: 276. 1971; F. Ehrendorfer in Bot. Journ. Linn. Soc. **70** (1): 3. 1975, pro syn. sub Sect. Platygali-um Koch. —Trichogalia DC. Prodr. **4**: 599. 1830, pro parte, pro Subsect; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **IV** (4): 151. 1891, pro Trichogali-um DC.; F. Ehrendorfer in Bot. Journ. Linn. Soc. **70** (1): 4. 1975, pro syn. sub Sect. Gali-um

通常为多年生草本。叶每轮常 4 片，1—3 脉，稀 5 脉。聚伞花序腋生或顶生，花序分枝常叉开，少至多花；花两性或单性，花冠辐状。果被钩毛，稀无毛。

组模式：林猪殃殃 G. paradoxum Maxim.

本组分 2 系。我国有 5 种、5 变种。



图版 54 1—4. 麦仁珠 *Galium tricorn* Stokes: 1. 果枝; 2. 叶; 3. 一段茎; 4. 果。5—8. 拉拉藤 *G. aparine* Linn. var. *echinospermum* (Wallr.) Cuf.: 5. 果枝; 6. 叶; 7. 一段茎; 8. 果。9—10. 纤细拉拉藤 *G. tenuissimum* M. Bieb.: 9. 果枝; 10. 果。(邓晶发绘)