

系 2. 圆叶系 Ser. 2. *Rotundifolia* Pobed. in Kom. Fl. URSS **23**: 329. 1958. et in Nov. Syst. Pl. Vasc. **7**: 276. 1971.

叶每轮 4 片, 相等, 1—3 脉, 如 3 脉, 有时不明显, 稀 5 脉。

系模式: *G. scabrum* Linn.

我国有 4 种、5 变种。

分种检索表

1. 叶 1 脉, 有时有不明显的 3 脉; 叶小, 长 2—12 毫米, 宽 1.5—5.5 毫米; 花序短, 长 0.5—1.5 厘米。
2. 茎和叶均无毛, 或在叶上面有疏伏毛; 叶下面非苍白色; 花冠裂片顶端不具细尖 18. 森氏猪殃殃 *G. morii* Hayata
2. 茎和叶均被毛; 叶下面苍白色; 花冠裂片顶端具细尖 19. 丽江拉拉藤 *G. forrestii* Diels
1. 叶 3 脉, 稀 5 脉; 叶较大, 长 0.6—4.5 厘米, 宽 3—20 毫米; 花序较长, 通常长 2 厘米以上。
3. 茎无毛; 叶顶端钝圆而有小尖头, 叶下面无腺点, 叶边缘不反卷; 果被毛 20. 三脉猪殃殃 *G. kantschaticum* Steller ex Roem. et Schult.
3. 茎被毛, 稀近无毛; 叶顶端稍钝, 急尖或渐尖, 叶下面有时有腺点, 叶边缘常反卷; 果被毛或无毛 21. 小红参 *G. elegans* Wall. ex Roxb.

18. 森氏猪殃殃 (台湾植物志)

Galium morii Hayata, Ic. Pl. Formos. **7**: 32, fig. 24. 1917; 台湾植物志 **4**: 262. 1978. — *G. sigeyosii* Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa **33**: 620. 1943.

直立草本, 高 5—10 厘米; 茎纤细, 无毛, 具 4 角棱, 在上部的节间长 8 毫米, 下部的节间长 2 毫米。叶纸质, 4 片轮生, 卵形或长圆形, 长 2—6 毫米, 宽 1.5—3 毫米, 顶端钝或具细尖状短尖, 基部阔楔形或钝, 两面无毛或在上部有疏伏毛, 1 脉或不明显地具 3 脉; 无柄或近无柄。聚伞花序腋生和顶生, 短, 长 0.5—1.5 厘米, 少花; 花小, 直径约 1.2 毫米; 花梗长约 1 毫米; 花冠辐状, 4 裂, 裂片卵形; 雄蕊 4 枚, 长约 0.5 毫米; 子房密被紧贴的钩毛。果肾形, 直径约 1 毫米, 双生, 密被钩毛。

产台湾 (嘉义)。生于山地。

19. 丽江拉拉藤 (云南种子植物名录)

Galium forrestii Diels in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **5**: 279. 1912; Lév. Fl. Kouy-Tchéou 366. 1915. et Cat. Pl. Yunnan 245. 1917; Cuf. in Oesterr. Bot. Zeitschr. **89**: 232. 1940; 云南种子植物名录, 下册: 1252. 1984.

草本, 高 15—25 厘米; 茎具 4 棱, 被糙伏毛状疏柔毛, 几不分枝。叶纸质, 每轮