

西、四川、贵州。生于山地、旷野、溪边的林中或草地，海拔 10—740 米。分布于日本、朝鲜。

23f. 狭叶四叶葎 (变种) (秦岭植物志)

var. *angustifolium* (Loesen.) Cuf. in Oesterr. Bot. Zeitschr. **89**: 221. 1940; 秦岭植物志 **1** (5): 20. 1985. — *G. gracile* Bunge var. vel f. *angustifolium* Loesen. in Beih. Bot. Centralbl. **37**: 182. 1920. — *G. mollugo* auct. non Linn.: E. Pritz. in Bot. Jahrb. **29**: 583. 1901, pro parte.

本变种与四叶葎不同的是：叶均为狭披针形或线状披针形，长 1—3 厘米，宽 1—6 毫米。花期 6—7 月，果期 8—10 月。

产河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州。生于山地、溪旁的林下、灌丛或草地，海拔 320—2200 米。模式标本采自山东。

24. 怒江拉拉藤 (云南种子植物名录)

Galium salwinense Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7** (4): 1028. 1936; Cuf. in Oesterr. Bot. Zeitschr. **89**: 223. 1940; 云南种子植物名录，下册：1252. 1984.

柔弱的草本，常平卧；茎多，近簇生，纤细，长 8—30 厘米，无毛或有极疏的长柔毛；根淡红色。叶纸质，4 片轮生，深绿色，在茎下部的常卵形或椭圆形，上部的长圆状椭圆形，长 5—18 毫米，宽 1.5—4 毫米，顶端稍短尖，基部渐狭，两面被疏糙伏毛，边缘具缘毛，1 脉；无柄或具短柄，叶柄有疏硬毛。聚伞花序腋生和顶生，少花，在顶端常 2—3 花；总花梗纤细而长，通常长 1—2.5 厘米；花小；花梗线形，长 3—6 毫米；花冠黄色，裂片三角形，长 0.5 毫米，顶端钝，有 3 条纹；雄蕊短；花柱近等长，纤细，柱头球形。果直径 1—1.5 毫米，分果片近球形，双生，密被短钩毛；果柄线形。花果期 7—10 月。

产四川 (马尔康、理县)、云南 (贡山)。生于山谷林下，海拔 1720—2800 米。模式标本采于云南贡山菖蒲桶。

25. 沼生拉拉藤 (新拟)

Galium palustre Linn. Sp. Pl. 105. 1753; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**: 451. 1911; Cuf. in Oesterr. Bot. Zeitschr. **89**: 232. 1940; Pobed. in Kom. Fl. URSS **23**: 331. 1958; 云南种子植物名录，下册：1252. 1984.

多年生草本，高 10—70 厘米；茎柔弱，平卧或上升，分枝铺散，具 4 棱，无毛或稍粗糙。叶纸质，4—5 片轮生，稀 6 片，线状倒披针形或线状长圆形，长 3—17 毫米，宽 0.5—4 毫米，顶端钝或稍尖，基部渐狭，两面无毛或有疏小毛，1 脉，近无柄。聚伞花序腋生和顶生，多而较疏，组成圆锥花序状；总花梗长 8—10 毫米，无毛；苞片成对，线形，长 1—3 毫米；花较多；花梗长 1—4 毫米，无毛；花冠白色，直径 3—4 毫