

14 毫米，宽 1—4 毫米，顶端圆或钝，很少近短尖，基部渐狭，无毛或近无毛，有时在边缘有极微小的倒生刺毛，1 脉，近无柄。聚伞花序腋生和顶生，不分枝或少分枝，通常长 1—2 厘米，亦有时长达 3.5 厘米，通常有花 3 或 4 朵；总花梗纤细；花小，直径约 2 毫米；花梗纤细，长 1—8 毫米；花冠白色，辐状，花冠裂片 3，稀 4 片，卵形，长约 1 毫米，宽约 0.8 毫米；雄蕊通常 3 枚；花柱长约 0.5 毫米，顶部 2 裂。果小，果片近球状，双生或有时单生，直径 1—2.5 毫米，干时黑色，光滑无毛；果柄纤细而稍长，长 2—10 毫米。 花果期 3—8 月。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏。生于旷野、沟边、山地林下、草坡、灌丛、沼泽地，海拔 300—2540 米。分布于日本、朝鲜、欧洲、美洲北部。

27b. 小猪殃殃 (变种) (中国高等植物图鉴) 东川拉拉藤 (云南种子植物名录)
var. *modestum* (Diels) Cuf. in Oesterr. Bot. Zeitschr. **89**: 233. 1940; 中国高等植物图鉴 **4**: 282. 1975. ——*G. modestum* Diels in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **5**: 280. 1912; Levl. Cat. Pl. Yunnan 245. 1917; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7** (4): 1027. 1936; 云南种子植物名录，下册: 1252. 1984.

本变种与小叶猪殃殃不同的是：花冠裂片有 3 脉，花柱不等的 2 裂。 花果期夏秋。

产四川、云南。生于潮湿处，海拔 1350—2500 米。分布于印度东北部。模式标本采自云南瑞丽—南底垭口。

组 6. 细长拉拉藤组 Sect. 6. *Leptogalium* Lange in Willk. et Lange, Prodr. Fl. Hisp. **2**: 308, 316. 1868; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **IV** (4): 151. 1891; Pobed. in Kom. Fl. URSS **23**: 336. 1958. et in Nov. Syst. Pl. Vasc. **7**: 278. 1971. ——*Leiogalia* DC. Prodr. **4**: 593. 1830, pro parte, pro Subsect.; F. Ehrendorfer in Bot. Journ. Linn. Soc. **70** (1): 4. 1975, pro syn. sub Sect. *Leiogalium* Ledeb.

多年生草本，直立、攀缘或平卧；茎平滑或沿棱倒向地粗糙。叶每轮 4—8 片，顶端常具短尖头，1 脉。聚伞花序腋生或顶生，疏散或结成圆锥花序式，总花梗和花梗通常纤细；花两性，花冠辐状。果无毛或被毛，或有小瘤状凸起。

组模式：*G. pumilum* Murr.

本组分 2 系。我国有 1 系 5 种、2 变种。

糙茎系 Ser. *Uliginosa* Pobed. in Kom. Fl. URSS **23**: 340. 1958. et in Nov. Syst. Pl. Vasc. **7**: 278. 1971.

茎沿棱倒向地粗糙的。

系模式：沼猪殃殃 *G. uliginosum* Linn.

我国有 5 种、2 变种。

分种检索表

1. 果被毛或有小瘤状凸起。
 2. 植株常攀缘；茎常附在其它树木上，聚伞花序腋生或顶生，多数；果被开展的钩状硬毛 28. 山猪殃殃 *G. pseudoasprellum* Makino
 2. 植株非攀缘；茎直立；聚伞花序顶生或生于上部叶腋，较少；果被紧贴的钩毛、短柔毛或小瘤状凸起 29. 大叶猪殃殃 *G. davuricum* Turcz. ex Ledeb.
1. 果无毛。
 3. 总花梗和花梗稍粗，较短，不呈毛发状；果具颗粒状的表面；叶小，倒披针形或披针形，长 3—16 毫米，宽 1—3 毫米 30. 沼猪殃殃 *G. uliginosum* Linn.
 3. 总花梗和花梗细长，毛发状；果不具颗粒状的表面。
 4. 茎直立；聚伞花序顶生或生于上部叶腋；叶顶端渐尖、急短渐尖、钝圆或微凹而有小凸尖；果柄长达 1 厘米 29. 大叶猪殃殃 *G. davuricum* Turcz. ex Ledeb.
 4. 茎近直立或攀缘；聚伞花序腋生或顶生；叶顶端锐尖或钝而有小凸尖；果柄长达 1.5 厘米。
 5. 叶纸质或革质，每轮 4—8 片，长圆状倒卵形、倒披针形或线状长圆形；花序多而开展，多花 31. 线梗拉拉藤 *G. comari* Levl. et Van.
 5. 叶薄纸质，每轮 4—6 片，常为 4 片，长圆状倒卵形或倒卵形；花序少，稀疏而少花 32. 昌化拉拉藤 *G. newerthi* Franch. et Savat.

28. 山猪殃殃 (东北植物检索表) 图版 57: 5—8

Galium pseudoasprellum Makino in Bot. Mag. Tokyo 17: 110. 1903; Cuf. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 89: 237. 1940; Kitagawa in Rep. Inst. Sci. Res. Manch. 4: 92. 1940; Hara, Enum. Sperm. Jap. 2: 9. 1952; 东北植物检索表 351. 1959; 秦岭植物志 1 (5): 25. 1985. —*G. asprellum* auct. non Michx.: Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 393. 1888, quoad specimen David 2212; E. Pritz. in Bot. Jahrb. 29: 583. 1901, quoad specimen Giraldi 1699.

28a. 山猪殃殃 (原变种)

var. *pseudoasprellum*

多年生草本，常攀缘，长达 2.5 米；根稠密；茎柔弱，纤细，常附在其他树木上，分枝，具 4 角棱，在棱上有倒向的疏小刺。叶纸质，6 片轮生，有时 4—5 片，线状披针形、线状长圆形或狭长圆形，长 0.7—4 厘米，宽 3—11 毫米，顶端短尖或稍钝，具短硬尖，基部急渐狭，在边缘和下面中脉上有倒向的小刺毛，在上面和中脉上有向上的