

茎沿棱倒向地粗糙的。

系模式：沼猪殃殃 *G. uliginosum* Linn.

我国有 5 种、2 变种。

分种检索表


1. 果被毛或有小瘤状凸起。
 2. 植株常攀缘；茎常附在其它树木上，聚伞花序腋生或顶生，多数；果被开展的钩状硬毛 28. 山猪殃殃 *G. pseudoasprellum* Makino
 2. 植株非攀缘；茎直立；聚伞花序顶生或生于上部叶腋，较少；果被紧贴的钩毛、短柔毛或小瘤状凸起 29. 大叶猪殃殃 *G. davuricum* Turcz. ex Ledeb.
 1. 果无毛。
 3. 总花梗和花梗稍粗，较短，不呈毛发状；果具颗粒状的表面；叶小，倒披针形或披针形，长 3—16 毫米，宽 1—3 毫米 30. 沼猪殃殃 *G. uliginosum* Linn.
 3. 总花梗和花梗细长，毛发状；果不具颗粒状的表面。
 4. 茎直立；聚伞花序顶生或生于上部叶腋；叶顶端渐尖、急短渐尖、钝圆或微凹而有小凸尖；果柄长达 1 厘米 29. 大叶猪殃殃 *G. davuricum* Turcz. ex Ledeb.
 4. 茎近直立或攀缘；聚伞花序腋生或顶生；叶顶端锐尖或钝而有小凸尖；果柄长达 1.5 厘米。
 5. 叶纸质或革质，每轮 4—8 片，长圆状倒卵形、倒披针形或线状长圆形；花序多而开展，多花 31. 线梗拉拉藤 *G. comari* Levl. et Van.
 5. 叶薄纸质，每轮 4—6 片，常为 4 片，长圆状倒卵形或倒卵形；花序少，稀疏而少花 32. 昌化拉拉藤 *G. niederthi* Franch. et Savat.
28. 山猪殃殃 (东北植物检索表) 图版 57: 5—8

Galium pseudoasprellum Makino in Bot. Mag. Tokyo 17: 110. 1903; Cuf. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 89: 237. 1940; Kitagawa in Rep. Inst. Sci. Res. Manch. 4: 92. 1940; Hara, Enum. Sperm. Jap. 2: 9. 1952; 东北植物检索表 351. 1959; 秦岭植物志 1 (5): 25. 1985. —*G. asprellum* auct. non Michx.: Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 393. 1888, quoad specimen David 2212; E. Pritz. in Bot. Jahrb. 29: 583. 1901, quoad specimen Giraldi 1699.

28a. 山猪殃殃 (原变种)

var. *pseudoasprellum*

多年生草本，常攀缘，长达 2.5 米；根稠密；茎柔弱，纤细，常附在其他树木上，分枝，具 4 角棱，在棱上有倒向的疏小刺。叶纸质，6 片轮生，有时 4—5 片，线状披针形、线状长圆形或狭长圆形，长 0.7—4 厘米，宽 3—11 毫米，顶端短尖或稍钝，具短硬尖，基部急渐狭，在边缘和下面中脉上有倒向的小刺毛，在上面和中脉上有向上的



图版 57 1—4. 钝叶拉拉藤 *Galium davuricum* Turcz. ex Ledeb. var. *tokyoense* (Makino) Cuf.; 1. 果枝; 2. 叶; 3. 一段茎; 4. 果。5—8. 山猪殃殃 *G. pseudoasprellum* Makino; 5. 果枝; 6. 叶; 7. 花; 8. 果。9—10. 线梗拉拉藤 *G. comari* Lévl. et Van.; 9. 果枝; 10. 果。(邓晶发绘)