

腋生或顶生，常在枝顶呈圆锥花序式排列，多花；花两性，花冠辐状。果被毛或无毛。

组模式：蓬子菜 *G. verum* Linn.

本组分 3 系。我国有 1 系 2 种、7 变种。

蓬子菜系 *Ser. Galium*——*Ser. Vera* Pobed. in Kom. Fl. URSS **23**: 354. 1958.
et in Nov. Syst. Pl. Vasc. **7**: 278. 1971.

果无毛，稀有多毛；叶在花后不向下弯；花药黄色。

系模式：蓬子菜 *G. verum* Linn.

我国有 2 种、7 变种。

分 种 检 索 表

1. 叶线形，边缘极反卷，常卷成管状；果无毛或有毛 36. 蓬子菜 *G. verum* Linn.

1. 叶狭披针形，边缘稍反卷，不成管状；果无毛 37. 卷边拉拉藤 *G. majmechense* Bordz.


36. 蓬子菜 (救荒本草) 松叶草 (日)，蛇望草、铁尺草、老鼠针 (四川)，柳绒蒿、疗毒蒿、鸡肠草、黄米花 (东北)，重台草 (陕西蓝田)，蓬子草 (陕西洋县)，乌如木杜乐 (蒙名) 图版 59: 1—3

Galium verum Linn. Sp. Pl. 107. 1753; DC. Prodr. **4**: 603. 1830; Franch. Pl. David. **1**: 156. 1883; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 395. 1888; Pampan. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. **17**: 720. 1910; Loes. in Beih. Bot. Centralbl. **37**: 182. 1920; Breslau et Krause in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. **12**: 491. 1922; Cuf. in Oesterr. Bot. Zeitschr. **89**: 216. 1940; Hara, Enum. Sperm. Jap. **2**: 12. 1952; 江苏南部种子植物手册 711. 1959; 东北植物检索表 350. 1959; 中国高等植物图鉴 **4**: 279, 图 5972. 1975; 内蒙古植物志 **5**: 328. 1980; 西藏植物志 **4**: 467. 1985; 秦岭植物志 **1** (5): 18. 1985; 黄土高原植物志 **5**: 17. 1989. ——*G. luteum* Lam. Fl. France **2**: 381. 1778. ——*G. verum* Linn. var. *leiocarpum* Ledeb. Fl. Ross. **2**: 414. 1844. ——*G. verum* Linn. a. *fructibus glabris* Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moscou **18** (Fl. Baical.-Dahur.): 316. 1845.

36a. 蓬子菜 (原变种)

var. *verum*

多年生近直立草本，基部稍木质，高 25—45 厘米；茎有 4 角棱，被短柔毛或秕糠状毛。叶纸质，6—10 片轮生，线形，通常长 1.5—3 厘米，宽 1—1.5 毫米，顶端短尖，边缘极反卷，常卷成管状，上面无毛，稍有光泽，下面有短柔毛，稍苍白，干时常变黑色，1 脉，无柄。聚伞花序顶生和腋生，较大，多花，通常在枝顶结成带叶的长可达 15



图版 59 1—3. 蓬子菜 *Galium verum* Linn.: 1. 花枝; 2. 叶; 3. 花。4—5. 卷边拉拉藤 *G. majmechense* Bordz.: 4. 果枝; 5. 叶。6—8. 小叶葎 *G. asperifolium* Wall. ex Roxb. var. *sikkimense* (Gand.) Cuf.: 6. 果枝; 7. 叶; 8. 果。9—10. 泡果拉拉藤 *G. bullatum* Lipsky: 9. 果枝; 10. 果。(邓晶发绘)