

1989. — *G. verum* Linn. β . *lasiocarpum* Ledeb. Fl. Ross. **2**: 415. 1844. — *G. verum* Linn. β . *fructibus villosopubescentibus* Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moscou **18** (Fl. Baical.-Dahur.): 316. 1845. — *G. verum* Linn. var. *typicum lasiocarpum* Maxim. in Bull. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb. **19**: 283. 1874. — *G. verum* auct. non Linn.: 贾祖璋、贾祖珊, 中国植物图鉴 123. 1937.

本变种与蓬子菜不同的是: 萼管和果被毛。 花果期 6—9 月。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、甘肃、青海、新疆、浙江、河南、四川、西藏。生于山坡、溪边、旷野、河滩的林下、灌丛或草地, 海拔 150—3860 米。分布于日本、朝鲜、俄罗斯、欧洲。

36h. 毛蓬子菜 (变种) (植物分类学报)

var. **tomentosum** (Nakai) Nakai in Journ. Jap. Bot. **15**: 348. 1939, excl. syn.; W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **28** (4): 303. 1990. — *G. verum* Linn. var. *ruthenicum* (Willd.) Nakai f. *tomentosum* Nakai in Bot. Mag. Tokyo **34**: 50. 1920; Hara, Enum. Sperm. Jap. **2**: 13. 1952.

本变种和蓬子菜不同的是: 叶上面被毛, 粗糙; 萼管和果被毛。 花果期 6—9 月。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、青海、新疆、四川。生于山坡林下、沟边、田边、草地, 海拔 450—3100 米。分布于日本。

37. 卷边拉拉藤 (植物分类学报) 图版 59: 4—5

Galium majmechense Bordz. in Bull. Jard. Bot. Kieff **5—6**: 21. 1927; Pobed. in Kom. Fl. URSS **23**: 361, pl. 20. fig. 3. 1958; W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **28** (4): 303. 1990.

多年生草本, 高 0.3—0.6 米; 根粗, 木质; 茎很多, 稍分枝, 具钝 4 角棱, 无毛, 在叶基部具一轮茸毛状的毛或稀短的卷毛, 有光泽。叶纸质, 每轮 6—8 片, 狭披针形, 长 2—2.8 厘米, 宽 1—3 毫米, 顶端具短尖头, 边缘稍反卷, 常有向上的疏刚毛, 下面苍白, 被微绒毛, 上面具光泽, 1 脉, 无柄。圆锥花序式的聚伞花序, 顶生和生于上部叶腋, 稍稠密, 多花, 呈长圆形, 二回三出分歧, 总花梗短; 花梗与花等长或较花短, 无毛; 花冠黄色, 辐状, 直径约 3 毫米, 花冠裂片卵形, 顶端具短尖; 花药橙黄色, 干时褐黄色; 柱头球形。果长 1.5 毫米, 宽 1 毫米, 无毛, 果片单生或双生。 花期 7—8 月。

产新疆 (察布查尔、克利苏)。生于灌木林中, 海拔约 1700 米。分布于俄罗斯、伊朗。

组 9. 平拉拉藤组 Sect. 9. *Leiogalum* Ledeb. Fl. Ross. **2**: 406. 1844; Pobed. in Kom. Fl. URSS **23**: 370. 1958, pro syn. sub Sect. *Eugalum* DC. et in Nov. Syst.