

Pl. Vasc. 7: 279. 1971, pro *Leiogalia* (DC.) Ledeb. ——*Leiogalia* DC. Prodr. 4: 593. 1830, pro parte, pro Subsect.; F. Ehrendorfer in Bot. Journ. Linn. Soc. 70 (1): 4. 1975, pro syn. sub Sect. *Leiogalium* Ledeb. ——*Eugaliun* DC. Prodr. 4: 593. 1830, pro parte; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV (4): 151. 1891, pro *Eugaliun* Koch; Pobed. in Kom. Fl. URSS 23: 370. 1958; F. Ehrendorfer in Bot. Journ. Linn. Soc. 70 (1): 4. 1975, pro syn. sub Sect. *Galium*

多年生草本；茎直立，粗壮或柔弱。叶每轮 4—8 片，1 脉，顶端具短尖头。聚伞花序腋生或顶生，少至多花，常呈圆锥花序式排列；花两性，花冠辐状。果无毛，稀有毛，平滑或稍有皱纹，或有小瘤状凸起；果皮膨胀或不膨胀。

组模式：*G. sylvaticum* Linn.

本组分 3 系。我国有 2 系 2 种、4 变种。

分系检索表

1. 叶每轮 6—8 片，稀 4 片；果皮不膨胀，果皮与种子紧密相连 …… 1. 直立茎系 Ser. **Erecta** Pobed.
1. 叶每轮 4—6 片；果皮膨胀，果皮与种子不紧密相连 …………… 2. 光果系 Ser. **Hyrcaunica** Pobed.

系 1. 直立茎系 Ser. 1. **Erecta** Pobed. in Kom. Fl. URSS 23: 370. 1958. et in Nov. Syst. Pl. Vasc. 7: 279. 1971.

茎上升、直立，通常无毛；总花梗和花梗较粗而短；果无毛，稀有无，果皮不膨胀。

系模式：*G. mollugo* Linn.

我国有 1 种、4 变种。

38. 楔叶葎 (新拟)

Galium asperifolium Wall. ex Roxb. Fl. Ind. ed. Carey 1: 381. 1820; Levl. Cat. Pl. Yunnan 245. 1917; Cuf. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 89: 239. 1940; Hara in Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 201. 1979. ——*G. pseudohirtiflorum* H. Li in Acta Phytotax. Sinica 18 (1): 117, fig. 2. 1980; 西藏植物志 4: 467, 图 197: 1—5. 1985, syn. nov.

38a. 楔叶葎 (原变种)

var. ***asperifolium***

多年生、蔓生或攀缘草本，高约 20—70 厘米，分枝多，扩展；茎较粗壮，具 4 棱，节稍膨大，多少被长柔毛或短硬毛，枝披散。叶纸质或革质，每轮 4—8 片，但通常为 6 片，楔状长圆形或倒披针形，在茎下部的叶通常较大，长 1.5—2.5 厘米，宽 3—6 毫