

的山坡、草地或灌丛。模式标本采自云南西北部。

38e. 毛果楔叶葎 (变种) (植物分类学报)

var. **lasiocarpum** W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **28** (4): 303. 1990.

本变种与楔叶葎不同的是: 萼管和果均被小硬毛。 花果期 5—10 月。

产广西、贵州、云南。生于山坡、田边、河边、林中, 海拔 1400—3200 米。模式标本采自云南屏边。

系 2. 光果系 Ser. 2. Hyrcanica Pobed. in Kom. Fl. URSS **23**: 375. 1958. et in Nov. Syst. Pl. Vasc. **7**: 279. 1971; F. Ehrendorfer in Bot. Journ. Linn. Soc. **70** (1): 5. 1975, pro syn. sub Sect. Orientigalium F. Ehrendorfer

茎通常被短柔毛, 稀无毛; 叶每轮 4—6 片; 果无毛, 果皮膨胀或不膨胀。

系模式: *G. grusinum* Trautv.

我国有 1 种。

39. 泡果拉拉藤 (植物分类学报) 图版 59: 9—10

Galium bullatum Lipsky in Acta Hort. Petrop. **13**: 300. 1894; Pobed. in Kom. Fl. URSS **23**: 377, pl. 20. fig. 2. 1958; W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **28** (4): 304. 1990.

多年生草本; 根粗, 木质, 褐色; 茎很多, 高 20—30 厘米, 直立, 在基部木质, 纤细, 具 4 角棱, 在节上肥大和稍白色, 沿棱具很短向下的糙硬毛, 稀无毛, 有光泽, 分枝, 具直而短向上的枝。叶纸质, 每轮 4—6 片, 线形, 长 10—17 毫米, 宽 1—2 毫米, 上部的较小, 顶端具短尖头, 基部渐狭, 沿边缘和叶上面具极细的毛或无毛, 1 脉, 无柄。聚伞花序顶生, 疏松, 少花; 总花梗和花梗均无毛; 花梗短, 与果等长或较果短; 花冠淡白色, 直径 4—5 毫米, 花冠裂片卵状长圆形, 中央具褐色条纹; 花丝向基部扩大, 花药黄色, 大, 花柱顶部 2 裂。果直径 3—3.5 毫米, 无毛, 白色, 有光泽, 具疏松的、膨胀的果皮, 果片单生或双生。 果期 8 月。

产新疆 (察布查尔)。生于草地, 海拔约 530 米。分布于俄罗斯。

组 10. 香拉拉藤组 Sect. 10. Trichocarpa (Pobed.) Pobed. in Nov. Syst. Pl. Vasc. **7**: 275. 1971; F. Ehrendorfer in Bot. Journ. Linn. Soc. **70** (1): 3. 1975, pro syn. sub Sect. Hylaea (Griseb.) F. Ehrendorfer——Asperula Sect. Trichocarpeae Pobed. in Kom. Fl. URSS **23**: 694. 1958. et op. cit. 217.

多年生草本; 叶每轮 4—10 片, 1 脉; 聚伞花序顶生, 分枝或不分枝; 花两性, 花冠钟状, 花冠管与花冠裂片等长或稍不等长; 果被毛或无毛。

组模式: 车轴草 *G. odoratum* (Linn.) Scop.