

我国有 2 种。

## 分种检索表

1. 果无毛；叶每轮 6 片，狭披针形 ..... 40. 新疆拉拉藤 *G. xinjiangense* W. C. Chen  
 1. 果被毛；叶每轮 6—10 片，倒披针形或狭椭圆形 ..... 41. 车轴草 *G. odoratum* (Linn.) Scop.  
 40. 新疆拉拉藤 (植物分类学报)

*Galium xinjiangense* W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica 28 (4): 304. 1990.

草本，直立，高约 0.6 米；茎通常不分枝，具 4 角棱，仅节上有微柔毛，节间长 5—9 厘米。叶纸质，每轮 6 片，狭披针形，长 5—6.5 厘米，宽 5—12 毫米，顶端渐尖，基部楔形或稍钝，两面无毛或在上部中脉上被疏微柔毛，边具短缘毛，1 脉，无柄或具极短的柄。聚伞花序顶生，长和宽均约 8—16 厘米，扩展，疏花，2—3 歧分枝；苞片常 2 枚，披针形，长 2—3 毫米；花梗纤细，长 2—2.5 毫米；花冠白色，钟状，直径 3.5—5 毫米，长约 4 毫米，花冠裂片 4，与冠管等长或较短，雄蕊 4 枚，着生在花冠管上，花丝极短；花柱极短，柱头球形，子房卵形。果卵形或近球形，无毛，单生或双生，长约 2.5 毫米，直径 1.5—3 毫米，果柄长 2.5—5 毫米。 花果期 7—8 月。

产新疆 (新源、尼勒克、巩留、台克斯山)。生于河谷、山坡林下、草地，海拔 1330—1900 米。模式标本采自新疆台克斯山。

41. 车轴草 (中国植物图鉴) 香车叶草 (秦岭植物志) 图版 60: 1—3

*Galium odoratum* (Linn.) Scop. Fl. Carn. ed. 2, 1: 105. 1771; Pobed. in Nov. Syst. Pl. Vasc. 7: 275. 1971; F. Ehrendorfer et F. Krendl in Fl. Europaea 4: 20. 1976. — *Asperula odorata* Linn. Sp. Pl. 103. 1753; 贾祖璋、贾祖珊, 中国植物图鉴 118. 1937; Pobed. in Kom. Fl. URSS 23: 217. 1958; 秦岭植物志 1 (5): 27, 图 18. 1985.

多年生草本，高 10—60 厘米；茎直立，少分枝，具 4 角棱，无毛，仅在节上具一环白色刚毛。叶纸质，6—10 片轮生，倒披针形、长圆状披针形或狭椭圆形，长 1.5—6.5 厘米，宽 4.5—17 毫米，在下部的较小，长 6—15 毫米，宽 3—5 毫米，顶端短尖或渐尖，或钝而有短尖头，基部渐狭，沿边缘和有时在下面沿脉上具短的、向上的刚毛或在两面被稀薄紧贴的刚毛，1 脉，无柄或具极短的柄。伞房花序式的聚伞花序顶生，长达 9 厘米；苞片在花序基部 4—6 片，在分枝处常成对，最小的长 1.5—2 毫米，披针形；花直径 3—7 毫米；花梗长 2—3 毫米，与总花梗均无毛；花冠白色或蓝白色，短漏斗状，长约 4.5 毫米，花冠裂片 4，长圆形，长 2.5 毫米，比冠管长；雄蕊 4 枚，具短的花丝；花柱短，2 深裂，柱头球形。果片双生或单生，球形，直径约 2 毫米，密被钩毛；果柄长约 4 毫米。 花果期 6—9 月。