

我国有 1 种。

45. 蔓生拉拉藤 (植物分类学报) 图版 60: 4—8

Galium humifusum M. Bieb. Fl. Taur.-Cauc. 1: 104. 1808; Pobed. in Nov. Syst. Pl. Vasc. 7: 276. 1971; F. Ehrendorfer et F. Krendl in Fl. Europaea 4: 22. 1976; W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica 28 (4): 305. 1990. —*Asperula humifusa* (M. Bieb.) Bess. Pl. Cremen. suppl. 3: 4. 1814; Pobed. in Kom. Fl. URSS 23: 276. 1958.

多年生草本; 根状茎纤细, 蔓生, 木质, 微红色; 根粗, 木质; 茎 1 至多个, 平铺, 长 0.2—1 米, 纤细, 具 4 角棱, 具白色柔毛, 稀近无毛, 常从基部分枝。叶纸质, 每轮 6—10 片, 狭披针形至线形, 长 0.5—2.3 厘米, 宽 1—5 毫米, 边缘常反卷, 两面有白色柔毛, 边缘具短的向上的刚毛, 常向下弯而几乎与茎紧贴, 1 脉, 近无柄。聚伞花序腋生或顶生, 有时组成伞房状的圆锥花序, 少至多花, 总花梗和花梗被短柔毛; 花梗长 1—4 毫米, 叉开, 在果时常向下弯; 花冠黄白色, 短漏斗状, 长 1.5—3 毫米, 花冠管与裂片等长或较短, 裂片长圆形, 顶端渐尖, 开放时反折; 雄蕊着生在冠管上, 花丝稍宽, 与花药等长或较长; 花柱顶部 2 裂, 柱头球形。果小, 无毛, 宽椭圆形, 长 1—1.5 毫米, 宽 1.5—2 毫米, 通常双生。 花果期 5—10 月。

产新疆。生于山坡、沟边、河滩、荒地、田边、林中、草地, 海拔 420—2200 米。分布于欧洲、亚洲 (中部和西部)。

尚待进一步研究的种和变种:

46. 湖北拉拉藤 (湖北植物大全)

Galium hupehense Pampan. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. 17: 719. 1910; Cuf. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 89: 224. 1940.

46a. 湖北拉拉藤 (原变种)

var. **hupehense**

草本; 根茎纤细, 匍匐; 茎直立, 具 4 角棱, 被短柔毛, 中部节间长约 5 厘米。叶每轮 4 片, 披针形, 长 3—5 厘米, 宽 7—12 毫米, 顶端渐狭, 稍钝, 上面粗糙, 被糙硬毛, 下面被短柔毛, 在脉上较密, 3 脉, 具极短的柄或近无柄。聚伞花序长约 6 厘米, 宽约 3 厘米, 总花梗三歧分枝, 稍叉开, 短, 被糙硬毛, 每一小枝具 3 花; 花直径 2 毫米; 花梗短, 无毛; 花冠淡黄白色, 辐状, 裂片卵形, 短尖, 内弯; 子房无毛。

产湖北 (宜昌)。生于山地, 海拔 1950 米。

46b. 毛鄂拉拉藤 (变种) (新拟)

var. **molle** (Hemsl.) Cuf. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 89: 224. 1940. —*G. boreale* Linn. var.? *molle* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 394. 1888; Breslau et Krause in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. 12: 491. 1922; Migo in Bot. Mag.



图版 60 1—3. 车轴草 *Galium odoratum* (Linn.) Scop.: 1. 果枝; 2. 叶; 3. 果。4—8. 蔓生拉拉藤
G. humifusum M. Bieb.: 4. 花果枝; 5. 叶; 6. 一段茎; 7. 花; 8. 一段果枝。(邓晶发绘)