

产台湾（高雄）。生于山地。

53. 南湖大山猪殃殃（台湾植物志）

Galium nankotaizanum Ohwi in Fedde, Repert. Sp. Nov. **36**: 56. 1934; 台湾植物志 **4**: 262. 1978.

多年生直立草本，高 10—20 厘米；茎纤细，具 4 角棱，疏被扩展的柔毛，节间通常长不及 1 厘米，少分枝或不分枝。叶膜质，每轮 4 片，疏，狭卵形、椭圆形或长圆形，长 5—7 毫米，宽 2—4 毫米，顶端短尖或近渐尖，基部狭或楔形，干时淡黑色，两面被疏柔毛，1 脉或不明显地具 3 脉；叶柄极短。聚伞花序顶生和腋生，伞形花序状，少花，较叶短，无苞片；花直径约 2 毫米；花梗短，无毛，长约 3 毫米；花冠白色，裂片 4，卵形，顶端短尖，长 1 毫米，开展，边稍内弯；雄蕊 4 枚，极短；花柱 2，钻状，长约 0.7 毫米，柱头头状。果密被灰黄色长毛。

产台湾（宜兰、花莲）。生于高山。模式标本采自台湾宜兰。

54. 高山猪殃殃（台湾植物志）

Galium maborasense Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa **29**: 219. 1939; 台湾植物志 **4**: 262. 1978.

矮小草本，高 5—10 厘米；茎无毛或被疏短柔毛，具 4 角棱，在棱上常疏生倒向的硬毛，节间长 1—2 厘米。叶每轮 4 片，椭圆形、卵形或倒卵状长圆形，长 5—7 毫米，宽 3—4 毫米，顶端有小凸尖至短尖，基部短尖至渐狭，两面在中脉上被疏糙硬毛，1 脉，无柄。聚伞花序顶生和腋生，3 花，无毛；花梗长 2—3 毫米；花萼密被毛；花冠辐状，4 裂，花冠裂片卵形，长 1.5 毫米，宽 1 毫米，3 脉，顶端急尖；雄蕊 4 枚，生于花冠裂片间，花丝长 0.5 毫米，花药长圆形；花柱极短，2 裂。果密被毛。

产台湾（南投）。生于高山。

55. 台湾猪殃殃（台湾植物志）

Galium taiwanense Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa **29**: 180. 1939; 台湾植物志 **4**: 264. 1978, excl. syn.

多年生草本；茎纤细，稍粗糙。叶每轮 4—6 片，线状倒披针形或倒卵状长圆形，长 7—15 毫米，宽 1—3 毫米，顶端短尖或渐尖，基部楔形，无毛或在中脉上有疏柔毛，1 脉，无柄。聚伞花序顶生和腋生，少花，三歧分枝；苞片线形，长约 2 毫米；花梗纤细，长约 5 毫米；萼管卵形，长约 0.7 毫米，宽 0.5 毫米，无毛，萼檐不明显；花冠辐状，直径 2 毫米，花冠裂片 4，卵形，长 1.5 毫米，宽约 0.7 毫米，顶端钝；雄蕊 4 枚，与花冠裂片互生，花丝丝状，长 0.5 毫米，花药长圆形。果片双生，球形，长 1.5 毫米，宽 2 毫米，无毛。 花果期 7 月。

产台湾（宜兰、花莲）。生于山坡，海拔 280—2100 米。模式标本采自台湾宜兰。

56. 中亚拉拉藤（新拟）