

期4—5月,果熟期8—9月。

产陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏等省区。生于海拔300—2600米的山坡、林下、沟边和草丛中,亦有栽种。日本也有分布。

为药用植物,可治跌打损伤,有去风湿、通经活血、解毒消炎之功效。

本种系 Lindley 根据自我国引种于英国 Chiswick 植物园的、初次开花的植物所采标本而定名。但国内外有不少人将本种定为原产东南亚的 *S. javanica* Reinw. ex Bl. 的异名。然而 *S. javanica* 的果实成熟时转紫黑色或黑色,本种是红色或桔红色的。在我国除云南和四川有少数记载果为黑色外,其余均为红色。因此作者认为本种目前以选用 *S. chinensis* 为其学名比较适当。采自云南和四川的、记载果为黑色的标本其形态特征与本种很难区别。《广西药用植物志》也说果为黑色。作者在昆明观察到新鲜材料,已成熟的果实确为黑色,但压碎后有紫红色汁液。也许 *S. javanica* 在我国西南地区确有分布。暂此存疑,留待后考。

3. 接骨木(唐本草、植物名实图考) 木蒴藋(唐本草),续骨草(本草纲目),九节风(中国经济植物志)

Sambucus williamsii Hance in Ann. Sci. Nat. IV. 5: 217. 1866; Franch. Pl. David. 1: 147. 1884; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1: 106. 1913; Hao in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 2(1): 1 et 21. 1933; 中国高等植物图鉴 4: 321, 图 6056. 1975. — *S. foetidissima* Nakai et Kitag. in Rep. Ist. Sci. Exp. Manchoukuo 4(1): 12. 1934; 刘慎谔等,东北木本植物图志 496. 1955. — *S. manshurica* Kitag. in Rep. Ist. Sci. Res. Manchoukuo 4: 117. 1940. — *S. latipinna* Nakai var. *pendula* Skv. in 刘慎谔等, 1. c. 567. — *S. racemosa* auct. non Linn.: Franch. l.c. Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 348. 1888; Graebn. in Bot. Jahrb. 29: 548. 1901; Hao in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 1(4): 79. 1931; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 1032. 1936. — *S. sieboldiana* auct. non Bl.: Graebn. in Bot. Jahrb. 29: 584. 1901; Schwerin in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. 18: 50. 1909; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1: 106. 1912; Hao in 1. c. 1(4): 80. 1931, et 2(1): 24. 1933. — *S. coreana* auct. non Kom.: 刘慎谔等 1. c. 499. — *S. latipinna* auct. non Nakai: 刘慎谔等 1. c. 497. — *S. foetidissima* Nakai f. *flava* Skv. et Wang-Wei 在刘慎谔等, 1. c. 567.

接骨木(原变种) 图版 2

Sambucus williamsii Hance var. ***williamsii***

落叶灌木或小乔木,高5—6米;老枝淡红褐色,具明显的长椭圆形皮孔,髓部淡褐色。羽状复叶有小叶2—3对,有时仅1对或多达5对,侧生小叶片卵圆形、狭椭圆形至倒矩圆状披针形,长5—15厘米,宽1.2—7厘米,顶端尖、渐尖至尾尖,边缘具不整齐锯齿,有时