

**Viburnum parvifolium** Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo **30**(1) (Mat. Fl. Formos.): 134. 1911; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 893. 1963, et Fl. Taiwan **4**: 717. 1978. — *V. yamadai* Barlett et Yamamoto in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. **19**: 104. 1929.

灌木;幼枝、叶柄和花序均密被簇状短毛;小枝纤细,广开展,枝直立,暗栗褐色,有明亮的微小皮孔,无毛。叶厚纸质,矩圆形或圆形,很少卵形,长1—3厘米,顶端圆形或稍尖,基部宽楔形至圆形,边缘基部除外具少数不整齐疏牙齿,上面仅脉上被簇状毛,下面散生簇状毛和棕色腺点,脉上毛较密,侧脉3(—4)对,直达齿端,基部一对作离基3出脉状,连同中脉上面凹陷,下面明显凸起,小脉上面凹陷,下面作网格状;叶柄长4—6毫米;托叶不存。伞形式聚伞花序顶生,总花梗长5毫米。花不详。果实红色,扁,矩圆形或圆形,长约10毫米,直径5—7毫米;核卵形,扁,长约6.5毫米,直径约4毫米,顶端微凸尖,基部微凹,有1浅腹沟。果熟期11月。

特产我国台湾中央山脉。生于海拔2700—3300米的山地。模式标本采自玉山。

#### 57. 臭荚蒾(拉汉种子植物名称)

**Viburnum foetidum** Wall. Pl. As. Rar. **1**: 49, t. 61. 1830; Hook. f. et Thoms. Journ. Linn. Soc. **2**: 175. 1858; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 4. 1880.

#### 臭荚蒾(原变种)

**Viburnum foetidum** Wall. var. **foetidum**

落叶灌木,高达4米;当年生小枝连同叶柄和花序均被簇状短毛,二年生小枝紫褐色,无毛。叶纸质至厚纸质,卵形、椭圆形至矩圆状菱形,长4—10厘米,顶端尖至短渐尖,基部楔形至圆形,边缘有少数疏浅锯齿或近全缘,上面除中脉密生短柔毛外均无毛,下面中脉及侧脉被簇状短毛,脉腋集聚簇状毛,近基部两侧有少数暗色腺斑,侧脉2—4对,弧形而达齿端,基部一对常作离基3出脉状,连同中脉上面略凹陷,下面明显凸起,小脉横列,下面稍凸起;叶柄长5—10毫米;通常无托叶。复伞形式聚伞花序生于侧生小枝之顶,直径5—8厘米,总花梗长(0.5—)2—5厘米,第一级辐射枝4—8条,花通常生于第二级辐射枝上;萼筒筒状,长约1毫米,被簇状短毛和微细腺点,萼齿卵状三角形,极短,被簇状短毛;花冠白色,辐状,直径约5毫米,散生少数短柔毛,裂片圆卵形,长约1.5毫米,超过筒,有极小腺缘毛;雄蕊与花冠等长或略超出,花药黄白色,椭圆形,长不到1毫米;花柱高出萼齿。果实红色,圆形,扁,长6—8毫米;核椭圆形,扁,有2条浅背沟和3条浅腹沟。花期7月,果熟期9月。

产西藏南部至东南部。生于林缘灌丛中,海拔1200—3100米。印度东北部、孟加拉、不丹、缅甸、泰国和老挝也有分布。

57a. 直角荚蒾(变种)(中国高等植物图鉴) 图版16:1—3