

毫米;雄蕊长 5—6 毫米,远高出花冠,花药矩圆状宽椭圆形;花柱高出萼齿。果实红色,长圆形至圆形;核扁,倒卵形,长 6—8 毫米,直径 5—6 毫米,有 2 条浅背沟和 3 条浅腹沟。花期 5—7 月,果熟期 9—10 月。

产安徽南部和西部、浙江西北部、江西北部、湖南(衡山、溆浦)、广西(阳朔)及贵州(梵净山)。生于山谷林中或山坡灌丛中,海拔 650—1300 米。模式标本采自湖南衡山南岳。

这是一个特征明显的种,表现在其叶大而无毛,顶端有时 3 浅裂或不规则分裂,冬芽长而尖,外鳞片远较内鳞片为短,总花梗甚长以及雄蕊突出于花冠之外等方面。可与浙皖荚蒾 *V. wrightii* Miq. 作比较,但本种叶柄不具托叶,总花梗远较长,花梗和萼筒均无腺,不难与该种区别。

62. 浙皖荚蒾(新拟)

Viburnum wrightii Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. **2** (Prol. Fl. Jap. 155): 267. 1866; Rehd. in Sarg. Trees and Shrubs **1**: 37, t. 19. 1902, et Bibl. Cult. Trees and Shrubs 606. 1949; Hara in Ginkgoana no. 5, 248. 1983.

落叶灌木,高达 3 米;当年小枝无毛或有少数糙毛。叶倒卵形至卵形或近圆形,长 7—14 厘米,顶端急渐尖,基部圆形或宽楔形,边缘有牙齿状粗尖齿,下面主脉和侧脉上有少数短糙伏毛,脉腋集聚簇状毛,有透明腺点;叶柄长 6—20 毫米。花序直径 5—10 厘米,无毛或有少数短糙毛,总花梗长 6—20 毫米。果实红色。花期 5—6 月,果熟期 9 月。

产安徽黄山和浙江昌化。生于溪边林下。日本和朝鲜也有分布。

A. Rehder 在 Journ. Arn. Arb. **8**:197. 1927 虽曾引证过本种的国产标本,但系误定的。

本种的国产标本同日本产的同种标本比较起来不尽相同,主要有以下区别:(1) 花冠蕾时外面常有稀疏糙毛,花开后变秃净,而日本标本花冠完全无毛;(2) 叶下面主脉和侧脉上的毛不及日本标本来得明显。但这些区别似不足以成为另立新分类群的依据。

本种从其芽鳞和叶下面脉上的糙毛和脉腋的簇聚毛,透明的腺点,以及雄蕊远高出花冠等特征来看,它与荚蒾 *V. dilatatum* Thunb. 最近亲。

63. 荚蒾(习惯用名)

Viburnum dilatatum Thunb. Fl. Jap. 124. 1784; Chun in Sunyatsenia **4**: 263. 1940; 中国高等植物图鉴 **4**: 319, 图 6052. 1975. — *V. erosum* Thunb. var. *hirsutum* Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. **17**: 726. 1910. — *V. dilatatum* Thunb. var. *macrophyllum* Hsu in Acta Phytotax. Sinica **11**(1): 78. 1966, syn. nov.

荚蒾(原变种)

Viburnum dilatatum Thunb. var. *dilatatum*

落叶灌木,高 1.5—3 米;当年小枝连同芽、叶柄和花序均密被土黄色或黄绿色开展的小刚毛状粗毛及簇状短毛,老时毛可弯伏,毛基有小瘤状突起,二年生小枝暗紫褐色,被疏