

Shrubs 608. 1949.

鸡树条(原变型) 图版 23: 5—7

Viburnum opulus* Linn. var. *calvescens* forma *calvescens

树皮质厚而多少呈木栓质。小枝、叶柄和总花梗均无毛。叶下面仅脉腋集聚簇状毛或有时脉上亦有少数长伏毛。花药紫红色。

产黑龙江、吉林、辽宁、河北北部、山西、陕西南部、甘肃南部、河南西部、山东、安徽南部和西部、浙江西北部、江西(黄龙山)、湖北和四川。生于溪谷边疏林下或灌丛中,海拔1000—1650米。日本、朝鲜和苏联西伯利亚东南部也有分布。

74b. **毛叶鸡树条**(新拟)(变型) 图版 23: 1—4

***Viburnum opulus* Linn. var. *calvescens* (Rehd.) Hara forma *puberulum* (Kom.) Sugimoto, New Key Jap. Trees 478. 1961; Hara in Ginkgoana no. 5, 272. 1983. — *V. sargentii* Koehne forma *puberula* Kom. in Acta Hort. Petrop. **25** (Fl. Mansh. 3): 511. 1907. — *V. pubinerve* Blume forma *puberulum* (Kom.) Nakai in Bot. Mag. Tokyo **33**: 212. 1919. — *V. sargentii* Koehne var. *puberulum* (Kom.) Kitag. Lineam. Fl. Mansh. 410. 1939, et Neo-Lineam. Fl. Mansh. 593. 1979.**

幼枝、叶下面、叶柄和总花梗均被带黄色长柔毛。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北(雾灵山、小五台山)及甘肃南部。生于山坡溪谷矮林内或河流附近杂木林中或林缘,海拔1200—2200米。日本、朝鲜和苏联远东地区也有分布。

种子含油26—28%,供制肥皂和润滑油。本种也是良好的庭园绿化树种。

不属于本属的种

V. chinense Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. 190. 1841, in nota = *Premna integrifolia* Linn.


V. dielsii Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **9**: 443. 1911, et Fl. Kouy-Tchéou 66. 1914. = *Callicarpa dielsii* (Lévl.) P'ei = *C. rubella* Lindl.

V. komarovii Lévl. et Vant. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **9**: 78. 1911, et Fl. Kouy-Tchéou 66. 1914. = *Photinia parvifolia* (Pritz.) Schneid. = *P. villosa* (Thunb.) DC. var. *parvifolia* (Pritz.) Hsu et L. C. Li

3. 薹子蕪族——*Triosteae* Hutch.

Hutch. Gen. Fl. Pl **2**: 84. 1967; Fukuoka in Mem. Fac. Sci. Kyoto Univ. Biol. **6**: 53. 1972; Hara in Ginkgoana no. 5, 95. 1983.

多年生草本。单叶,全缘,几无柄,两叶基部常相连。花腋生或成顶生穗状花序;花冠



1—4.毛叶鸡树条 *Viburnum opulus* Linn. var. *calvescens* (Rehd.) Hara forma *puberulum* (Kom.) Sugimoto: 1.花枝, 2.花放大, 3.叶, 4.果核横切面放大。5—7.鸡树条 *V. opulus* Linn. var. *calvescens* (Rehd.) Hasa: 5.果枝, 6.叶, 7.叶背放大。(张荣生绘)