

漏斗状或高脚碟状，5—4 裂，整齐，筒基部稍呈浅囊状，内面被长柔毛；雄蕊 5—4 枚，着生于花冠筒，内藏或稍伸出，花药内向；子房 4 室，其中 2 室含数枚不育的胚珠，另 2 室各具 1 悬垂的胚珠，花柱纤细，柱头头状或稍 2 裂。果实为具两核的浆果状核果，白色、红色或黑色，圆形、卵圆形或椭圆形；核卵圆形，多少扁；种子具胚乳，胚小。

本属有 16 种，其中 15 种产于北美洲至墨西哥，我国中南部产 1 种。

模式种：小花毛核木 *S. orbiculatus* Moench

毛核木(中国高等植物图鉴) 雪果(中国种子植物科属辞典)，雪莓(中国树木分类学) 图版 26

***Symphoricarpos sinensis* Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1: 117. 1911; 陈嵘, 中国树木分类学 1160. 1937; 中国高等植物图鉴 4: 301, 图 6015. 1975.**

直立灌木，高 1—2.5 米；幼枝红褐色，纤细，被短柔毛，老枝树皮细条状剥落。叶菱状卵形至卵形，长 1.5—2.5 厘米，宽 1.2—1.8 厘米，顶端尖或钝，基部楔形或宽楔形，全缘，上面绿色，下面灰白色，两面无毛，近基部三出脉，侧脉不明显；叶柄长 1—2 毫米。花小，无梗，单生于短小、钻形苞片的腋内，组成一短小的顶生穗状花序，下部的苞片叶状且较长；萼筒长约 2 毫米，萼齿 5 枚，卵状披针形，长约 1 毫米，顶急尖，无毛；花冠白色，钟形，长 5—7 毫米，裂片卵形，稍短于筒，内外两面均无毛；雄蕊 5 枚，着生于花冠筒中部，与花冠等长或稍伸出，花药白色，长 2 毫米；花柱长 6—7 毫米，无毛，柱头头状。果实卵圆形，长 7 毫米，顶端有 1 小喙，蓝黑色，具白霜；分核 2 枚，密生长柔毛。花期 7—9 月，果熟期 9—11 月。

产陕西、甘肃南部、湖北西部、四川东部、云南北部和广西。生于海拔 610—2200 米的山坡灌木林中。模式标本采自湖北房县。

6. 北极花属* *Linnaea* Gronov. ex Linn.

Linn. Sp. Pl. 631. 1753; Fritsch in Engl. u. Prantl, Nat Pflanzenfam.


IV. 4: 165. 1891. — *Linnaea* Subgen. *Eulinnaea* Graebn. in Bot.

Jahrb. 29: 124. 1900.

常绿匍匐亚灌木；小枝细长而上升。叶小，对生，有叶柄，无托叶。花具细长花梗，成对着生于小枝顶端；苞片 1 对，着生于两花梗基部，小苞片 1—2 对，紧贴萼筒基部；萼筒密被具柄的腺毛和短柔毛，萼檐 5 裂；花冠钟状，整齐 5 裂；雄蕊 4 枚，二强，着生于花冠筒内，花药内向，内藏；子房 3 室，仅 1 室发育，花柱细长，柱头头状。瘦果状核果，不开裂，内含种子 1 枚。

为广布于北半球高寒地带的单种属，被 Gronovius 命名以纪念植物学家林奈 Carl

* 属的异名：林奈木属(中国种子植物科属辞典)



毛核木 *Symphoricarpos sinensis* Rehd.: 1.花枝, 2.花放大, 3.花纵剖面放大, 4.二种叶形, 5.果实, 6.果核放大。(张荣生绘)