

毫米。伞房状聚伞花序具长 1—1.5 厘米的总花梗,花梗几不存在;苞片披针形,紧贴子房基部;萼筒外面密生长刚毛,上部缢缩似颈,裂片钻状披针形,长 0.5 厘米,有短柔毛;花冠淡红色,长 1.5—2.5 厘米,直径 1—1.5 厘米,基部甚狭,中部以上突然扩大,外有短柔毛,裂片不等,其中二枚稍宽短,内面具黄色斑纹;花药宽椭圆形;花柱有软毛,柱头圆形,不伸出花冠筒外。果实密被黄色刺刚毛,顶端伸长如角,冠以宿存的萼齿。花期 5—6 月,果熟期 8—9 月。

为我国特有种,产山西、陕西、甘肃、河南、湖北及安徽等省。生于海拔 350—1340 米的山坡、路边和灌丛中。模式标本采自陕西华山。

美丽的观赏植物,欧洲已广泛引种。

8. 六道木属 *Abelia* R. Br.

R. Br. in Abel, Narr. Jour. China App. B, 376, t. 1818; Zabel in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. 2: 32. 1893. — *Linnaea* Sect. II. *Abelia* (R. Br.) A. Braun et Vatke in Oesterr. Bot. Zeitschr. 22: 291. 1872, pro parte; Fritsch in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV. 4: 166. 1891, pro parte. — *Zabelia* (Rehd.) Makino in Makinoa 9: 175. 1948.

落叶或很少常绿灌木。冬芽小,卵圆形,具数对鳞片。叶对生,稀 3 枚轮生,全缘或具齿牙或圆锯齿,具短柄,无托叶。具单花、双花或多花的总花梗顶生或生于侧枝叶腋,也有三歧分枝的聚伞花序或伞房花序;苞片 2—4 枚;花整齐或稍呈二唇形;萼筒狭长,矩圆形,萼檐 5、4 或 2 裂,裂片扁平,开展,狭矩圆形、椭圆形或匙形,具 1、3 或 7 条脉,宿存;花冠白色或淡玫瑰红色,筒状漏斗形或钟形,挺直或弯曲,基部两侧不等或一侧膨大成浅囊,4—5 裂;雄蕊 4 枚,等长或二强,着生于花冠筒中部或基部,内藏或伸出,花药黄色,内向;子房 3 室,其中 2 室各具 2 列不育的胚珠,仅 1 室具 1 枚能育的胚珠,花柱丝状,柱头头状。果实为革质瘦果,矩圆形,冠以宿存的萼裂片;种子近圆柱形,种皮膜质;胚乳肉质,胚短,圆柱形。

约 20 余种,分布于中国、日本、中亚及墨西哥。我国有 9 种。

模式种: 糯米条 *A. chinensis* R. Br.

本属植物花期长,开花后花萼裂片宿存增大,常变红色,经久不凋,植株耐寒,为庭园观赏佳品。

分 种 检 索 表

1. 叶柄基部不扩大亦不连合;枝节不膨大;花冠钟形或钟状漏斗形(组 1. 六道木组 Sect. *Abelia*)。

2. 由多花集合成的聚伞花序生于小枝上部叶腋; 萼裂片 5 枚; 雄蕊和柱头明显地伸出花冠筒外…………… 1. 糯米条 *A. chinensis* R. Br.
2. 花单生于侧枝顶部叶腋; 雄蕊和柱头几不伸出花冠筒外。
3. 萼裂片 5 枚…………… 2. 细瘦六道木 *A. forrestii* (Diels) W. W. Smith
3. 萼裂片 2 枚。
4. 侧生或顶生于短枝上的总花梗具 2—4 花; 花无柄; 幼枝无毛或被短柔毛。
5. 叶较大, 长 3—8 厘米, 卵形, 基部钝; 幼枝光滑无毛…………… 3. 二翅六道木 *A. macrotera* (Graebn. et Buchw.) Rehd.
5. 叶较小, 长 1.5—4 厘米, 矩圆形或近菱形, 基部渐狭; 幼枝被短柔毛…………… 4. 薔梗花 *A. engleriana* (Graebn.) Rehd.
4. 侧生、具苞的总花梗上具 1—2 花; 幼枝除被短柔毛外尚夹杂糙硬毛或腺毛; 叶片边缘内卷…………… 5. 小叶六道木 *A. parvifolia* Hemsl.
1. 叶柄基部扩大并连合; 枝节膨大; 花冠漏斗形, 筒部圆柱形; 雄蕊和花柱不伸出花冠外(组 2. 管花六道木组 Sect. *Zabelia* Rehd.)
6. 萼裂片 5 枚; 花单生于侧枝顶端叶腋; 叶卵形或矩圆形, 全缘, 长 1.5—3 厘米, 宽 0.5—1.5 厘米 …… 6. 醉鱼草状六道木 *A. buddleioides* W. W. Smith
6. 萼裂片 4 枚; 单花或双花以至多花生于侧枝的顶端或叶腋, 有时密集成聚伞花序或伞房花序; 叶全缘或具缺刻, 长 2—6 厘米, 宽 1—2.5 厘米。
7. 无总花梗; 花单生于叶腋…………… 7. 六道木 *A. biflora* Turcz.
7. 具总花梗。
8. 总花梗仅具 2 朵花…………… 8. 南方六道木 *A. dielsii* (Graebn.) Rehd.
8. 总花梗具 4—8 朵花, 成复聚伞花序… 9. 聚伞六道木 *A. umbellata* (Graebn. et Buchw.) Rehd.

组 1. 六道木组——Sect. 1. *Abelia*——Sect. *Euabelia* Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1: 123 et 125. 1911.——*Linnæa* Linn. Subgen. *Eulinnæa* (Vatke) Graebn. Sect. *Mutilaciniatae* Graebn. in Bot. Jahrb. 29: 127. 1900.

枝节不膨大。叶柄基部不连合。萼裂片 2—5 枚; 花冠钟状漏斗形; 雄蕊和花柱超出花冠喉部。

本组我国有 5 种。

1. 糯米条(中国树木分类学) 图版 29

Abelia chinensis R. Br. in Abel, Narr. Jour. China App. B, 376. t. 1818; Turrill in Bot. Mag. t. 168. 1951; 陈嵘, 中国树木分类学 1165. 1957.——*A. rupestris* Lindl. in Journ. Hort. Soc. Lond. 1: 63. 1846, et in Bot. Reg. 32: t. 8. 1846.——*A. hanceana* Martius ex Hance in Ann. Sci. Nat. Bot. V. 5: 216. 1866.——*Linnæa chinensis* (R. Br.) A. Braun et Vatke in Oesterr. Bot. Zeitschr. 22: 291. 1872; Graebn. in Bot. Jahrb. 29: 139. 1900.——*L. rupestris* (Lindl.) A. Braun et Vatke in l. c.; Graebn. in l. c. 138.——*L. aschersoniana* Graebn. in l. c. 139.——*A. aschersoniana* (Graebn.) Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1: 127. 1911.——*A. ionandra* Hayata, Ic. Pl. Fo-