

缘,有时顶端疏生 2—3 对浅齿,上面初时被柔毛,后变光滑无毛,下面灰白色,侧脉 3—4 对,与主脉均被白色柔毛;叶柄长 6—14 毫米。聚伞花序簇生于侧生短枝顶端叶腋,花梗纤细,长约 1 厘米;苞片条形,被微柔毛,早落;2 对小苞片形状、大小不等,紧贴萼筒的一对盾状,呈稍偏斜的圆形至矩圆形,宿存而增大,成熟时最宽处达 2 厘米,干膜质,脉明显,下方一对为一前一后,均小,其中一枚卵形,钝头,基部宽,紧裹花梗,长 1 厘米,另一枚更小,狭椭圆形,长仅 6 毫米;萼筒疏被硬毛,萼齿条形,等长,长 6—7 毫米,具腺毛,坚硬而宿存;花冠粉红色,长 3—4 厘米,筒中部以下狭细圆柱形,上部开展呈钟形,稍呈二唇形,裂片圆形至矩圆形,长约 5 毫米,下唇喉部桔黄色;花柱丝状,无毛。果实具棱角,连同萼齿为宿存而增大的小苞片所包被。花期 4—7 月,果熟期 8—9 月。

产陕西、甘肃、湖北、湖南、广西、四川等地。生于海拔 650—2200 米的杂木林下或灌丛中。模式标本采自陕西汉中。

2. 云南双盾木(中国高等植物图鉴) 云南双楮(中国树木分类学) 图版 33: 5—8

Dipelta yunnanensis Franch. in Rev. Hort. **11**: 246, fig. 62. 1891; Franch. in Journ. de Bot. **10**: 309. 1896; Diels in Notes Bot. Gard. Edinb. **6**(98): 255. 1912, et **17** (182): 205, 245, 291 et 399. 1930; Lév. Cat. Pl. Yun-Nan: **27**. 1915; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **16**: 333. 1935; 中国高等植物图鉴 **4**: 302, 图 6017. 1975——*D. ventricosa* Hemsl. in Gard. Chron. ser. 3, **44**: 101, fig. 37. 1908; Hutch. in Bot. Mag. **136**: t. 8294. 1910; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. **1**: 118. 1911, et Man. Cult. Trees and Shrubs ed. 2, 845. 1940.

落叶灌木,高达 4 米;幼枝被柔毛。冬芽具 3—4 对鳞片。叶椭圆形至宽披针形,长 5—10 厘米,宽 2—4 厘米,顶端渐尖至长渐尖,基部钝圆至近圆形,全缘或稀具疏浅齿,上面疏生微柔毛,主脉下陷,下面沿脉被白色长柔毛,边缘具睫毛;叶柄长约 5 毫米。伞房状聚伞花序生于短枝顶部叶腋;小苞片 2 对,一对较小,卵形,不等形,另一对较大,肾形;萼檐膜质,被柔毛,裂至 $\frac{2}{3}$ 处,萼齿钻状条形,不等长,长约 4—5 毫米;花冠白色至粉红色,钟形,长 2—4 厘米,基部一侧有浅囊,二唇形,喉部具柔毛及黄色块状斑纹;花丝无毛;花柱较雄蕊长,不伸出。果实圆卵形,被柔毛,顶端狭长,2 对宿存的小苞片明显地增大,其中一对网脉明显,肾形,以其弯曲部分贴生于果实,长 2.5—3 厘米,宽 1.5—2 厘米;种子扁,内面平,外面延生成脊。花期 5—6 月,果熟期 5—11 月。

产陕西、甘肃、湖北、四川、贵州和云南等地。生于海拔 880—2400 米的杂木林下或山坡灌丛中。模式标本采自云南西北部。

3. 优美双盾木(中国高等植物图鉴) 图版 33: 9—11

Dipelta elegans Batal. in Acta Hort. Petrop. **14**(8): 174. 1895; 中国高等植物图鉴 **4**: 302. 1975.



1—4.双盾木 *Dipelta floribunda* Maxim.: 1.花枝, 2.花纵剖面放大, 3.具苞的幼果放大, 4.幼果放大。
 5—8.云南双盾木 *D. yunnanensis* Franch.: 5—6. 具苞的幼果(原大), 7.幼果放大, 8.叶。9—11.优美双盾木
D. elegans Batal.: 9.具苞的幼果(原大), 10.幼果放大, 11.叶。(张荣生绘)

落叶灌木，高达 2 米。叶椭圆形，长 5—10 厘米，宽 2—5 厘米，顶端长渐尖，基部急尖，全缘或上半部有浅而疏的齿牙，被腺毛，除边缘和下面沿脉稍被柔毛外，两面无毛，具短柄。花单生或由 4 朵花组成伞房状聚伞花序生于枝顶部叶腋；总花梗比叶柄长；花梗细长，疏被具腺柔毛；苞片条形，着生于花梗基部；小苞片 2 对，一对狭卵形至披针形，另一对钝卵形，无柄，外被腺毛，贴生于花基部；开花时萼筒下部为小苞片所遮盖，萼檐钟形，疏被长柔毛和腺毛，浅裂，萼齿圆钝，长宽几相等，为萼檐长的 $\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$ ，大小不等；花冠大，宽漏斗形，外面密被短柔毛，筒较花萼长而外露，筒内和下唇喉部有时甚至裂片上均被疏柔毛，筒基部一侧呈浅囊状，喉部突然扩大，二唇形，裂片长为扩大部分的 $\frac{1}{3}$ ；雄蕊与花柱等长；柱头头状，花柱被疏柔毛。宿存于果实的盾形苞片特大，直径达 4 厘米。花期 5—6 月，果熟期 9 月。

产甘肃宕昌(西固)、舟曲。生于海拔 2000 米以上的山坡阔叶林内。模式标本采自甘肃东部。

5. 锦带花族——*Diervilleae* C. A. Mey.

C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. St. Pétersb. **13**: 219.
1855.

灌木。单叶。花单生或成聚伞花序；花冠钟状漏斗形，不整齐或近整齐；雄蕊 5 枚；子房 2 室，每室多数胚珠，花柱细长。蒴果，革质或木质，有多数种子。

本族有 2 属 10 余种。我国有 1 属 3—4 种。

10. 锦带花属 *Weigela* Thunb.

Thunb. in Svenska Vetensk. Akad. Handl. ser. 2, **1**: 137, t. 5.
1780, et in Trans. Linn. Soc. **2**: 331. 1794; Bailey in Gent. Herb.
2(1): 45 & 48. 1929.—*Diervilla* DC. Prodr. **4**: 330. 1830, pro
parte

落叶灌木；幼枝稍呈四方形。冬芽具数枚鳞片。叶对生，边缘有锯齿，具柄或几无柄，无托叶。花单生或由 2—6 花组成聚伞花序生于侧生短枝上部叶腋或枝顶；萼筒长圆柱形，萼檐 5 裂，裂片深达中部或基底；花冠白色、粉红色至深红色，钟状漏斗形，5 裂，不整齐或近整齐，筒长于裂片；雄蕊 5 枚，着生于花冠筒中部，内藏，花药内向；子房上部一侧生 1 球形腺体，子房 2 室，含多数胚珠，花柱细长，柱头头状，常伸出花冠筒外。蒴果圆柱形，革质或木质，2 瓣裂，中轴与花柱基部残留；种子小而多，无翅或有狭翅。