

Prodr. 4: 329. 1830, p. p. typ.

灌木或木质藤本;枝有时中空。单叶,边全缘或具锯齿或缺刻。花常成对生于总花梗之顶,或成轮伞花序;花冠钟状、筒状或漏斗状,整齐或二唇形,基部常一侧肿大或具囊;雄蕊 5 枚;子房 2—5(7—10) 室。浆果,含少数至多数种子。

本族共 2 属 200 余种,我国有 2 属 104 种。

11. 鬼吹箫属 *Leycesteria* Wall.

Wall. in Roxb. Fl. Ind. 2: 181. 1824; Airy-Shaw in Kew Bull. 1932:

161. et 1949: 32.

落叶灌木或小灌木;小枝常中空。单叶,对生,全缘或有锯齿,很少浅裂;托叶存在或否。由 2—6 朵花的轮伞花序合成的穗状花序顶生或腋生,有时紧缩成头状,常具显著的叶状苞片;萼裂片 5,不等形或近等形;花冠白色、粉红色或带紫红色,有时橙黄色,漏斗状,整齐,裂片 5;雄蕊 5,花药丁字状背着;子房 5—8(—10) 室,每室有多数胚珠,花柱细长,柱头盾状或头状。浆果,具宿存萼;种子微小,多数。

约 8 种,分布于喜马拉雅地区、缅甸。我国有 6 种,分布于西南部的温带和亚热带山区。

模式种: 鬼吹箫 *L. formosa* Wall.

分种检索表

1. 穗状花序每节具 6 朵花。
 2. 花冠白色或粉红色,有时带紫红色;花序腋生或顶生;叶下面的毛被非微柔毛。
 3. 穗状花序具 2 至数轮花;花冠外面被短柔毛或无毛。
 4. 两叶柄间无托叶;叶下面、叶柄和花序疏生弯伏短柔毛或近无毛;花冠外面被短柔毛。
 5. 萼裂片短,长 1—3(—5) 毫米(如长 4—5 毫米,则为 2 长 3 短)……1. 鬼吹箫 *L. formosa* Wall.
 5. 萼裂片较长,长 4—7(—9) 毫米(如长 4—5 毫米,则决不 2 长 3 短)……………1a. 狭萼鬼吹箫 *L. formosa* var. *stenosepala* Rehd.
 4. 两叶柄间具明显的托叶;叶下面、叶柄和花序均被绵毛;花冠外面无毛……………3. 绵毛鬼吹箫 *L. stipulata* (Hook. f. et Thoms.) Fritsch
 3. 穗状花序仅具 1 轮花,外观似头状花序;花冠外面疏被微腺毛;叶下面脉上疏生糙毛……………2. 华鬼吹箫 *L. sinensis* Hemsl.
 2. 花冠鲜橙黄色;花序顶生;叶下面被微柔毛……………4. 黄花鬼吹箫 *L. crocothyrsos* Airy-Shaw
1. 穗状花序每节仅具 2 朵花。
 6. 叶下面仅中脉和侧脉疏生短糙伏毛;总花梗基部无小形叶;苞片比萼筒短;萼筒无毛或有时被微糙毛……………5. 纤细鬼吹箫 *L. gracilis* (Kurz) Airy-Shaw
 6. 叶下面被由糙毛组成的灰白色毡毛;总花梗基部具 1—2 对小形叶;苞片比萼筒长;萼筒被长糙伏毛……………

毛,并夹生小腺毛……………6.西藏鬼吹箫 *L. tibetica* H. J. Wang

1. 鬼吹箫(中国高等植物图鉴) 云通(西藏)

Leycesteria formosa Wall. in Roxb. Fl. Ind. 2: 182. 1824; DC. Prodr. 4: 340-1830; Wall. Pl. As. Rar. 2: 21, t. 120. 1831; Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. 2: 173. 1858; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 2: 752, fig. 471 f-k. 1911; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1: 311. 1912; 中国高等植物图鉴 4: 300. 1975. — *L. formosa* Wall. var. *brachysepala* Airy-Shaw in Kew Bull. 1932: 161, syn. nov.

鬼吹箫(原变种) 图版 35: 1—7

Leycesteria formosa Wall. var. *formosa*

灌木,高1—2(—3)米,全体常被或疏或密的暗红色短腺毛;小枝、叶柄、花序梗、苞片和萼齿均被弯伏短柔毛。叶纸质,卵状披针形、卵状矩圆形至卵形,长(4—)6—12(—13)厘米,先端长尾尖、渐尖或短尖,基部圆形至近心形或阔楔形,边常全缘,有时波状或具疏齿或有不整齐浅缺刻,上面被短糙毛,中脉毛较密,下面疏生弯伏短柔毛或近无毛;叶柄长5—12(—15)毫米。穗状花序顶生或腋生,每节具6朵花,具3朵花的聚伞花序对生,中央1花无柄,侧生2花具极短的柄,总花梗长(8—)10—25(—30)毫米;苞片叶状,绿色、带紫色或紫红色,每轮6枚,最下面一对较大,阔卵形、卵形至披针形,长达2(—3.5)厘米,先端短尖至尾尖;小苞片极小,长不足1毫米;萼筒矩圆形,长3—4毫米,密生糙毛和短腺毛,萼檐深5裂,裂片圆卵形、披针形至条状披针形,长1—3(—5)毫米,常2长3短;花冠白色或粉红色,有时带紫红色,漏斗状,长(1.2—)1.4—1.8厘米,外面被短柔毛,裂片圆卵形,长5毫米左右,筒外面基部具5个膨大成近圆形的囊肿,囊内密生淡黄褐色蜜腺;雄蕊约与花冠等长,花药矩圆形;花柱稍伸出花冠,柱头盾状;子房5室。果实由红色变黑紫色,卵圆形或近圆形,直径5—7毫米,具宿存萼齿;种子微小,多数,淡棕褐色,广椭圆形至矩圆形,稍扁平,长1.2—1.5毫米。花期(5—)6—9(—10)月,果熟期(8—)9—10月。

产四川西部、贵州西部、云南(西南部除外)和西藏南部至东南部。生于山坡、山谷、溪沟边或河边的林下、林缘或灌丛中,海拔1100—3300米。也分布于印度、尼泊尔、锡金和缅甸。

全株可药用,有破血、祛风、平喘之效,主治风湿性关节炎、月经不调及尿道炎;西藏波密民间还用治眼病。

Airy-Shaw 曾根据产于云南西部和东南部的、萼裂片长仅达1毫米(极少可达2毫米)的标本定名为短萼变种 *L. formosa* var. *brachysepala*。但从尹文清 60-1294(采自云南腾冲)的二份同号标本来看,其中一份果实的萼裂片长0.5—1.5毫米,而另一份的幼果萼齿长达3—5毫米,与原变种萼裂片的长度存在着过渡现象,故此变种不能成立。

1a. 狭萼鬼吹箫(中国高等植物图鉴) 叉活活(云南),梅竹叶(云南) 图版 35: 8

Leycesteria formosa Wall. var. *stenosepala* Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1: 312.