

毛,并夹生小腺毛……………6.西藏鬼吹箫 *L. tibetica* H. J. Wang

1. 鬼吹箫(中国高等植物图鉴) 云通(西藏)

Leycesteria formosa Wall. in Roxb. Fl. Ind. 2: 182. 1824; DC. Prodr. 4: 340-1830; Wall. Pl. As. Rar. 2: 21, t. 120. 1831; Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. 2: 173. 1858; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 2: 752, fig. 471 f-k. 1911; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1: 311. 1912; 中国高等植物图鉴 4: 300. 1975. — *L. formosa* Wall. var. *brachysepala* Airy-Shaw in Kew Bull. 1932: 161, syn. nov.

鬼吹箫(原变种) 图版 35: 1—7

Leycesteria formosa Wall. var. *formosa*

灌木,高1—2(—3)米,全体常被或疏或密的暗红色短腺毛;小枝、叶柄、花序梗、苞片和萼齿均被弯伏短柔毛。叶纸质,卵状披针形、卵状矩圆形至卵形,长(4—)6—12(—13)厘米,先端长尾尖、渐尖或短尖,基部圆形至近心形或阔楔形,边常全缘,有时波状或具疏齿或有不整齐浅缺刻,上面被短糙毛,中脉毛较密,下面疏生弯伏短柔毛或近无毛;叶柄长5—12(—15)毫米。穗状花序顶生或腋生,每节具6朵花,具3朵花的聚伞花序对生,中央1花无柄,侧生2花具极短的柄,总花梗长(8—)10—25(—30)毫米;苞片叶状,绿色、带紫色或紫红色,每轮6枚,最下面一对较大,阔卵形、卵形至披针形,长达2(—3.5)厘米,先端短尖至尾尖;小苞片极小,长不足1毫米;萼筒矩圆形,长3—4毫米,密生糙毛和短腺毛,萼檐深5裂,裂片圆卵形、披针形至条状披针形,长1—3(—5)毫米,常2长3短;花冠白色或粉红色,有时带紫红色,漏斗状,长(1.2—)1.4—1.8厘米,外面被短柔毛,裂片圆卵形,长5毫米左右,筒外面基部具5个膨大成近圆形的囊肿,囊内密生淡黄褐色蜜腺;雄蕊约与花冠等长,花药矩圆形;花柱稍伸出花冠,柱头盾状;子房5室。果实由红色变黑紫色,卵圆形或近圆形,直径5—7毫米,具宿存萼齿;种子微小,多数,淡棕褐色,广椭圆形至矩圆形,稍扁平,长1.2—1.5毫米。花期(5—)6—9(—10)月,果熟期(8—)9—10月。

产四川西部、贵州西部、云南(西南部除外)和西藏南部至东南部。生于山坡、山谷、溪沟边或河边的林下、林缘或灌丛中,海拔1100—3300米。也分布于印度、尼泊尔、锡金和缅甸。

全株可药用,有破血、祛风、平喘之效,主治风湿性关节炎、月经不调及尿道炎;西藏波密民间还用治眼病。

Airy-Shaw 曾根据产于云南西部和东南部的、萼裂片长仅达1毫米(极少可达2毫米)的标本定名为短萼变种 *L. formosa* var. *brachysepala*。但从尹文清 60-1294(采自云南腾冲)的二份同号标本来看,其中一份果实的萼裂片长0.5—1.5毫米,而另一份的幼果萼齿长达3—5毫米,与原变种萼裂片的长度存在着过渡现象,故此变种不能成立。

1a. 狭萼鬼吹箫(中国高等植物图鉴) 叉活活(云南),梅竹叶(云南) 图版 35: 8

Leycesteria formosa Wall. var. *stenosepala* Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1: 312.