

本种花冠橙黄色,在属内是独一无二的。鬼吹箫 *L. formosa* Wall. 的花冠基部也有 5 个明显的囊肿,与本种比较接近,但本种托叶较大,花柱被柔毛,易于与该种区别。在具有托叶的种类中,与绵毛鬼吹箫 *L. stipulata* (Hook. f. et Thoms.) Fritsch 的不同在于本种叶下面不具绵毛,花柱被柔毛;与西藏鬼吹箫 *L. thibetica* H. J. Wang 的区别在于叶下面被微柔毛,顶生穗状花序约 7 轮,每轮具 6 朵花,以及萼裂片卵状椭圆形等特征。

依 Airy-Shaw, 本种的模式标本——F. K. Ward 8180 系采于印度阿萨姆邦 Delei Valley, 28°20' N., 96°37' E., 海拔 1800 米的山坡悬崖片麻岩上稠密灌丛中。根据我国的地图,上述产地实系我国西藏察隅西南的大宗普地区。

5. 纤细鬼吹箫(中国高等植物图鉴) 图版 36: 2—7

*Leycesteria gracilis* (Kurz) Airy-Shaw in Hook. Ic. Pl. **32**: t. 3166. 1927, et in Kew Bull. **1932**: 174; Merr. in Brittonia **4**(1): 177. 1941; 中国高等植物图鉴 **4**: 300, 图 6014. 1975. ——*Lonicera gracilis* Kurz in Journ. As. Soc. Beng. **39**(2): 77. 1870.


灌木,高 1.5—3(—4) 米。叶厚纸质,矩圆状披针形或矩圆状卵形,长 7—12(—18) 厘米,顶端渐尖至长尾尖,基部圆形、截形或近心形,边缘稍内卷,具疏腺齿和疏缘毛,上面中脉基部有短糙伏毛,下面粉绿色,在放大镜下可见稠密灰白色或淡黄褐色微粒状鳞片,沿中脉和侧脉疏生短糙伏毛;叶柄长 6—10 毫米,被短糙伏毛。穗状花序顶生或腋生,每节有花 2 朵、苞片 1 枚和小苞片 2 枚;苞片和小苞片卵状披针形或披针形,长为萼筒的 1/3—1/2,疏被微糙毛和微腺缘毛;萼筒长 5—6 毫米,顶端较狭细,有时被微糙毛,萼檐长 2.5—3.5 毫米,下部合生成浅杯状,裂片条状披针形至披针形,长 1.5—2 毫米,常具微腺缘毛;花冠白色,漏斗状,长 1.5—2 厘米,裂片卵形或圆卵形,长 5—7 毫米,筒外面基部有 5 个浅囊,囊内密生蜜腺和糙毛;雄蕊稍短于花冠;子房(5—)7—8(—10) 室,含多数胚珠。果实由红色变蓝紫色,矩圆形或椭圆形,长 10—13 毫米。花期(9—)10—11(—12) 月,果熟期(3—)4—5 月。

产云南东南部和西南部至西北部(独龙江、怒江等流域)和西藏东南部(墨脱)。生于山坡、山谷和溪沟边的林下或灌丛中,海拔 2000—3800 米。锡金、不丹和缅甸也有分布。

6. 西藏鬼吹箫(新拟) 西藏风箫(植物分类学报) 图版 37: 6—10

*Leycesteria thibetica* H. J. Wang in Acta Phytotax. Sinica **16**(4): 124. 1978.

灌木,高 1—2 米左右;当年小枝草质,疏生糙毛和短腺毛,二年生小枝几无毛。叶纸质,卵状披针形至矩圆状披针形,长 4.5—10.5 厘米,顶端渐尖、长渐尖或短尖,基部圆形,两侧不等,边缘稍内卷,除基部全缘外,疏生锯齿,上面疏被糙毛和微腺毛,下面密生灰白色毡毛状糙毛,脉上还夹杂糙伏毛,下面沿网脉及其周围在放大镜下可见密生的微糙毛;叶柄短,长 4 毫米左右,被糙伏毛;叶柄间的托叶形状变化大,阔倒卵形、肾形、半圆形



1. 绵毛鬼吹箫 *L. stipulata* (Hook. f. et Thoms.) Fritsch: 示叶下具绵毛。2—7. 纤细鬼吹箫 *L. gracilis* (Kurz) Airy-Shaw: 2. 果枝, 3. 花放大, 4. 花纵剖示蜜腺囊放大, 5. 果放大, 6. 果实横切面放大, 7. 子房横切面放大。(张荣生绘)