

毛,并散生桔红色小腺毛,边缘具短糙毛;叶柄长达1毫米。总花梗极短;苞片叶状,倒披针形,长1.2—1.5毫米,有柄,毛被同于叶;杯状小苞长不及1毫米,顶端不整齐截形,具细睫毛;相邻两萼筒分离,长约1.2毫米,萼檐比萼筒短,萼齿极短,卵状三角形,顶钝,边缘有细睫毛;花冠白色,筒状,长5—7毫米,筒长3—5毫米,直径2—3毫米,外面密被短糙毛,内面密生柔毛,裂片近圆形,几相等,长1.5—2毫米;雄蕊生于花冠筒上部,花药达花冠喉部,花丝极短;花柱长约为花冠筒的 $\frac{2}{5}$ 。果实不详。花期5—8月。

产西藏(吉隆)。生山坡灌丛中,海拔3700—4400米。尼泊尔也有分布。

4. 越桔叶忍冬(中国高等植物图鉴)丘马(西藏亚东)

Lonicera myrtillus Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. **2**: 168. 1858; Rehd. in Sarg. Trees and Shrubs **1**: 87, pl. 44. 1903; Hara, Fl. East. Himal. **2**: 126. 1971; 中国高等植物图鉴 **4**: 284, 图 5981. 1975. — *Caprifolium parvifolium* O. Ktze. Rev. Gen. Pl **1**: 274. 1891. — *L. myrtillus* Hook. f. et Thoms. var. *depressa* Rehd. in Sarg. l. c. 87, syn. nov. — *L. angustifolia* Wall. ex DC. var. *rhododactyla* W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb. **10**: 45. 1917, syn. nov. — *L. parvifolia* auct. non Hayne 1822, nec Edgeworth 1851: Hook. f. et Thoms. in l. c.

越桔叶忍冬(原变种) 图版 38: 3—8

Lonicera myrtillus Hook. f. et Thoms. var. **myrtillus**

落叶多枝灌木,高达3米,叶、叶柄和苞片(有时包括小苞片和萼齿)常疏生红褐色微腺缘毛;幼枝灰褐色或带红紫色,被直的微糙毛或无毛,有时夹杂微腺毛,老枝直立或仰卧,灰褐色或灰黑色。冬芽有数对顶尖的鳞片。叶纸质或厚纸质,形状变化很大,在短枝上常呈倒卵形至倒卵状矩圆形或倒披针形,有时矩圆形至宽椭圆形或卵形,长0.5—2厘米,宽3—8毫米,顶端钝至圆形而常具小凸尖或短尖,基部楔形,无毛,很少下面或仅中脉散生短糙毛,老叶下面常有极小锈色斑点;叶柄长1—2毫米,无毛或很少具微糙毛。总花梗出自侧生短枝的叶腋,长1—15毫米,无毛或有微糙毛;苞片叶状,形状和大小的变化与叶相类似,长常超过萼齿;杯状小苞顶端截形或有浅齿,有时裂为2片,长为萼筒的 $\frac{1}{2}$ 至相等;相邻两萼筒中部以上至全部合生,萼檐浅杯状,萼齿三角形或卵状三角形,常不相等,顶端钝或有时稍尖;花冠白色、淡紫色或紫红色,筒状钟形,长6—8毫米,外面无毛,筒内有柔毛,喉部毛较密,裂片圆卵形或近圆形,长为筒的 $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$;雄蕊和花柱内藏,花药长约1毫米,达花冠筒中部以上至喉部稍下处;花柱较短,柱头达花冠筒中部或上部 $\frac{1}{3}$ 处。果实紫红色,近圆形,直径4—6毫米;种子淡褐色,卵圆形至矩圆形,扁,长2—3毫米。花期5—6(—7)月,果熟期8—9月。

产四川西南部,云南西部、西北部至北部和西藏南部至东南部。生于山坡灌丛、溪旁疏林及河谷滩地石砾上,海拔2400—4000(—4700)米。阿富汗至缅甸北部也有分布。

这个种与狭叶忍冬 *L. angustifolia* Wall. ex DC. 之间无论在叶的形状、大小和毛被